

Algebra II - Práctica 8.

Segundo cuatrimestre de 2003.

1. Probar que los grupos abelianos \mathbb{Q}^* , \mathbb{R}^* , \mathbb{C}^* , $\mathbb{Q}_{>0}$ y $\mathbb{R}_{>0}$ no son finitamente generados
2. Probar que
 - (a) Todo módulo de tipo finito posee un sistema de generadores minimal
 - (b) Para todo $n \in \mathbb{N}$ existe en \mathbb{Z} (considerando a \mathbb{Z} como \mathbb{Z} -módulo) un sistema de generadores minimal con n elementos
3. Probar que
 - (a) Todo submódulo de un módulo localmente cíclico es localmente cíclico
 - (b) Si M es localmente cíclico y $f : M \rightarrow N$ es un epimorfismo de A -módulos entonces N es localmente cíclico
 - (c) \mathbb{Q} y \mathbb{Q}/\mathbb{Z} son grupos abelianos (\mathbb{Z} -módulos) localmente cíclicos pero no son de tipo finito
4. Sea A un dominio íntegro y sea $a \in M_n(A)$. Para cada $1 \leq j \leq n$ sea $v_j = (a_{1j}, \dots, a_{nj}) \in A^n$. Probar que
 - (a) $\{v_1, \dots, v_n\}$ es linealmente independiente si y sólo si $\det(A) \neq 0$.
 - (b) $\{v_1, \dots, v_n\}$ es un sistema de generadores de A^n si y sólo si $\det(A) \in \mathcal{U}(A)$.
5. Dar un ejemplo de
 - (a) Un A -módulo finitamente generado que no sea Noetheriano.
 - (b) Un A -módulo tal que todo submódulo propio sea finitamente generado y que no sea Noetheriano.
6. Probar que
 - (a) Un \mathbb{K} -espacio vectorial V es Noetheriano si y sólo si $\dim_{\mathbb{K}}(V) < \infty$.
 - (b) Todo anillo principal a izquierda es Noetheriano a izquierda.
 - (c) \mathbb{Z} y $K[X]$ (con K cuerpo) son anillos Noetherianos.
7. Sea A un anillo y sea M un A -módulo. Sea $f \in \text{End}_A(M)$ y, para cada $n \in \mathbb{N}$, sean $K_n = \text{Ker}(f^n)$, $I_n = \text{Im}(f^n)$. Probar que
 - (a) $K_1 = K_2 \Rightarrow K_1 \cap I_1 = 0$.
 - (b) $I_1 = I_2 \Rightarrow K_1 + I_1 = M$.
 - (c) Si M es Noetheriano entonces $\exists n \in \mathbb{N}$ tal que $K_n \cap I_n = 0$.
 - (d) Si M es Noetheriano y f es un epimorfismo entonces f es un automorfismo.
8. Sea $d \in \mathbb{Z}$ y sea \sqrt{d} una raíz cuadrada de d en \mathbb{C} . Sea $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ el submódulo de \mathbb{C} formado por los elementos de la forma $a + b\sqrt{d}$ con $a, b \in \mathbb{Z}$. Probar que $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ es Noetheriano
9. Probar que no existe un epimorfismo de grupos
 - (a) de \mathbb{Z}_{p^∞} en $\mathbb{Z}_{p^\infty} \oplus \mathbb{Z}_p$

- (b) de \mathbb{Q} en $\mathbb{Z}_{p^\infty} \oplus \mathbb{Z}_{p^\infty}$
(c) de \mathbb{Q}/\mathbb{Z} en $\mathbb{Z}_{p^\infty} \oplus \mathbb{Z}_n$
10. Sea p un primo. Probar que no existe una sección
- (a) de \mathbb{Z}_p en $\mathbb{Z}_{p^2} \oplus \mathbb{Z}_{p^2}$
(b) de $\mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p$ en $\mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_{p^2}$
(c) de $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_p$ en $\mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_{p^2}$
11. 14. Calcular
- (a) $\text{Hom}(\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}_n, \mathbb{Z}_p)$
(b) $\text{Hom}(\bigoplus_{p \text{ primo}} \mathbb{Z}_p, G_3)$
12. Sea G un grupo abeliano y sean S y T subgrupos de G tales que $G \sim S \oplus T$. Probar que si existe un monomorfismo de \mathbb{Q} en G entonces existe un monomorfismo de \mathbb{Q} en S o existe un monomorfismo de \mathbb{Q} en T .
13. (a) Sea $e : \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$ un morfismo de grupos. Probar que e es un proyector si y sólo si $\exists a \in \mathbb{Z}_n$ tal que $n \mid a^2 - a$ y $e(x) = a \cdot x$ para todo $x \in \mathbb{Z}_n$
(b) Sea $a \in \mathbb{Z}_n$, sea $f : \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$ el morfismo definido por $f(x) = a \cdot x$ y sea $d = (a, n)$. Probar que $\text{Ker}(f) = \langle \frac{n}{d} \rangle$ y que $\text{Im}(f) = \langle d \rangle$
(c) Sean $n, d \in \mathbb{Z}$. Probar que si $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_r^{\alpha_r}$, con p_1, \dots, p_r primos positivos distintos y $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{N}$ entonces $d = (a, n)$ para algún $a \in \mathbb{Z}$ tal que n divide a $a^2 - a$ si, y sólo si, $d = p_1^{\beta_1 \cdot \alpha_1} \dots p_r^{\beta_r \cdot \alpha_r}$ con $\beta_i \in \mathbb{N}_0$, $0 \leq \beta_i \leq 1$
(d) Encontrar los sumandos directos de \mathbb{Z}_n y, para cada uno de ellos, determinar un suplemento
14. Sea
- $$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M'' & \longrightarrow & 0 \\ & & f' \downarrow & & f \downarrow & & & & \\ 0 & \longrightarrow & N' & \longrightarrow & N & \longrightarrow & N'' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$
- un diagrama conmutativo de A -módulos, con filas exactas. Probar que existe una única $f'' : M'' \rightarrow N''$ que completa el diagrama conmutativo y que, si f y f' son isomorfismos, entonces f'' es un isomorfismo.
15. Sea A un anillo y M un A -módulo. Decidir si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa:
- (a) Si M es libre, entonces es sin torsión.
(b) Si A es íntegro entonces M libre $\Rightarrow M$ sin torsión.
(c) Si $f : M \rightarrow N$ es un morfismo de A -módulos y M es de torsión entonces $\text{Im}(f)$ es de torsión.
(d) Si $f : M \rightarrow N$ es un morfismo de A -módulos y M es sin torsión entonces $\text{Im}(f)$ es sin torsión.
(e) Si A es conmutativo y N es sin torsión entonces $\text{Hom}_A(M, N)$ es sin torsión.
(f) Si A es conmutativo, M es de torsión y N es sin torsión entonces $\text{Hom}_A(M, N) = 0$.
16. Calcular $t(\mathbb{R}/\mathbb{Z})$.

17. Sea A un dominio principal que no es un cuerpo y sea M un A -módulo. Probar:
- Sea $p \in A$ un irreducible y $a \in A - \{0\}$. Entonces $(A / \langle a \rangle)[p] \simeq A / \langle p^n \rangle$ donde $n = \max\{k \in \mathbb{N}_0 / p^k | a\}$.
 - M es simple $\iff \exists p \in A$ irreducible tal que $M \simeq A / \langle p \rangle$.
 - M es un A -módulo sin torsión $\iff \text{Hom}_A(S, M) = 0$ para todo A -módulo simple S .
18. Sea A un dominio principal y sea M un A -módulo de tipo finito (es decir finitamente generado). Probar:
- M es de torsión $\iff \text{Hom}_A(M, A) = 0$.
 - M es indescomponible (es decir, no tiene sumandos directos propios) $\iff M \simeq A$ o $\exists p \in A$ irreducible y $n \in \mathbb{N}$ tales que $M \simeq A / \langle p^n \rangle$.
19. Sea A un dominio principal y sea M un A -módulo. Probar:
- Si M es de tipo finito y S es un submódulo libre de M tal que M/S es sin torsión, entonces M es libre.
 - Si M no es de torsión y M/S es de tipo finito con torsión para todo submódulo $S \neq 0$ de M , entonces $M \simeq A$. Análogamente, si G es un grupo infinito tal que todo subgrupo no nulo tiene índice finito, $G \simeq \mathbb{Z}$.
20. Sea p un primo positivo. Clasificar todos los grupos abelianos de orden p^3 , p^4 y p^5 .
21. Clasificar los grupos abelianos de orden 18, 45, 100 y 180.
22. (a) Sea G un grupo abeliano finito y sea p un primo positivo que divide al orden de G . Probar que el número de elementos de orden p en G es coprimo con p .
- (b) Para cada grupo abeliano G de orden p^2q^2 (donde p y q son primos distintos) determinar cuántos elementos de orden pq y cuántos elementos de orden pq^2 hay en G .
23. Caracterizar los grupos abelianos finitamente generados tales que:
- Todo subgrupo propio de G es cíclico.
 - Todo subgrupo propio de G es de orden primo.
 - G posee exactamente 2 subgrupos propios no nulos.
 - G posee exactamente 3 subgrupos propios no nulos.
 - Todo subgrupo propio no nulo de G es maximal.
 - Para todo par de subgrupos S y T de G , $S \subseteq T$ o $T \subseteq S$.
 - El orden de todo elemento no nulo de G es primo.
 - G/S es cíclico para todo subgrupo S no nulo de G .
 - Todo par de subgrupos propios no nulos son isomorfos.
24. Calcular los factores invariantes (coeficientes de estructura) de los siguientes grupos abelianos:
- $\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_6 \oplus \mathbb{Z}_9$.
 - $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_8 \oplus \mathbb{Z}_{14}$.
 - $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_{49} \oplus \mathbb{Z}$.
 - $\mathbb{Z}_{12} \oplus \mathbb{Z}_{21} \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_{20} \oplus \mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_7$.

- (e) G un grupo abeliano de orden 36 que tiene exactamente 2 elementos de orden 3 y que no tiene elementos de orden 4.
- (f) G un grupo abeliano de orden 225 que tiene por lo menos 40 elementos de orden 15 y tal que todo subgrupo de orden 9 de G es isomorfo a $\mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3$.
25. Determinar los factores invariantes de los siguientes grupos abelianos dados por generadores y relaciones:
- (a) $G = \langle a, b, c \rangle$; $2a + 3b = 0$; $2a + 4c = 0$
- (b) $G = \langle a, b, c \rangle$; $a = 3b$; $a = 3c$
- (c) $G = \langle a, b, c \rangle$; $3a = -c$; $3a = 3c - 8b$
- (d) $G = \langle a, b, c \rangle$; $3a = b$; $b = 3c$
26. Calcular los coeficientes de estructura de los siguientes cocientes:
- (a) \mathbb{Z}^4/S con $S = \{m \in \mathbb{Z}^4 / m_1 + m_2 + m_3 + m_4 = 0, m_1 + m_2 - 2m_3 = 0\}$.
- (b) \mathbb{Z}^3/S con $S = \{m \in \mathbb{Z}^3 / m_1 \text{ es par}, m_1 + 5m_2 - m_3 = 0\}$.
- (c) \mathbb{Z}^3/S con $S = \{m \in \mathbb{Z}^3 / m_1 = m_2 + m_3 \text{ es par}, 3|m_3\}$.
27. Sean p, q y r primos positivos. Determinar la cantidad de grupos no isomorfos de orden n , en cada uno de los siguientes casos:
- (a) $n = p^6 q^3 r$.
- (b) $n = p^2 q^4 r^5$.
- (c) $n = p^3 q^4$.
28. (a) Sea G un grupo abeliano de orden n . Probar que si d es un divisor de n , G posee subgrupos y grupos cocientes de orden d .
- (b) Sea $n \in \mathbb{N}$. ¿Para qué divisores d de n existe un grupo abeliano de orden n y exponente d ?
- (c) Caracterizar los grupos abelianos finitos de orden menor o igual que 100 de exponente 9, 20 y 21.
- (d) Sea G un grupo abeliano y sea $x \in G$ un elemento tal que $\text{ord}(x) = \exp(G)$. Probar que $\langle x \rangle$ es un sumando directo de G .
29. Sea H un subgrupo de \mathbb{Z}^n .
- (a) Probar que $[\mathbb{Z}^n : H]$ es finito si y sólo si H es de rango n .
- (b) Si H es de rango n , sea $\{v_1, \dots, v_n\}$ una base de \mathbb{Z}^n y sea $\{h_1, \dots, h_n\}$ una base de H . Si $h_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} v_i$, probar que $[\mathbb{Z}^n : H] = |\det(a_{ij})|$.