

PRÁCTICA 5

1. Calcular las derivadas parciales de segundo orden para las siguientes funciones, verificando la igualdad de las derivadas parciales mixtas para aquellas funciones de clase C^2 .

$$(a) f(x, y) = x^3y + e^{xy^2} \qquad (b) f(x, y, z) = e^z y + \frac{e^y}{x} + xy \sin z$$

$$(c) f(x, y) = x^2 e^{\frac{y}{x}} + y^2$$

2. Determinar en cada caso si existe una función f que satisfaga las condiciones requeridas. Si existe alguna, encontrar todas.

$$(a) \nabla f(x, y) = (3x^2y + 2y^2, x^3 + 4xy - 1), f(1, 1) = 4.$$

$$(b) \nabla f(x, y) = (5y, 2x).$$

$$(c) \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = e^{xy} + xy e^{xy} + \cos x + 1, \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2 e^{xy}.$$

$$(d) \nabla f(x, y, z) = (e^{y+z^2}, xe^{z^2} + \cos y, 2xze^y e^{z^2}), f(0, 0, 0) = 1.$$

3. (a) Supongamos que f es de clase C^2 en \mathbb{R}^2 y que $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = 0 \forall (x, y)$.

Probar que $f(x, y) = g(x) + h(y)$.

- (b) Sean f de clase C^2 en \mathbb{R}^2 y que $\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} - \frac{\partial^2 f}{\partial^2 y} = 0$.

i. Si llamamos $u = x + y$ y $v = x - y$, calcular $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}$.

ii. Probar que $f(x, y) = g(x + y) + h(x - y)$.

4. (a) Hallar la fórmula de Taylor de segundo orden para las funciones dadas en el punto indicado. Escribir la forma de Lagrange del residuo.

$$i. f(x, y) = (x + y)^2 \quad \text{en } (0, 0) \quad ii. f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 + 1} \quad \text{en } (0, 0)$$

$$iii. f(x, y) = e^x \sin y \quad \text{en } (2, \frac{\pi}{4}) \quad iv. f(x, y) = \ln(1 + xy) \quad \text{en } (2, 3)$$

$$v. f(x, y) = x + xy + 2y \quad \text{en } (1, 1) \quad vi. f(x, y) = x^y \quad \text{en } (1, 2)$$

- (b) Utilizando los resultados anteriores evaluar $(0.95)^{2.01}$

i. con error $\varepsilon < \frac{1}{500}$ ii. con error $\varepsilon < \frac{1}{5000}$

5. Hallar el polinomio de segundo grado que mejor aproxima, en el origen, a la función

$$f(x, y) = \sin x \sin y$$

6. Encontrar los puntos críticos de las siguientes funciones y verificar que son puntos de ensilladura:

$$(a) f(x, y) = x^2 - y^2 \qquad (b) f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x$$

$$(c) f(x, y) = xy \qquad (d) f(x, y) = \begin{cases} e^{\frac{1}{xy}} & \text{si } xy \neq 0 \\ 0 & \text{si } xy = 0 \end{cases}$$

14. Encontrar los extremos de f sujetos a las restricciones mencionadas:

$$(a) f(x, y) = x - y + z \quad x^2 + y^2 + z^2 = 2$$

$$(b) f(x, y) = 2x - 2y - 3z \quad x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$$

$$(c) f(x, y) = \frac{x^2 + 3 \sin x \cos x}{e^x} \quad x^2 + y^2 + z^2 = 0$$

$$(d) f(x, y) = xy \quad \frac{|xy|}{|xy|+1} \leq 1$$

15. Resolver los siguientes problemas geométricos mediante el método de Lagrange:

(a) Encontrar la distancia más corta desde el punto $(1, 2, 3) \in \mathbb{R}^3$ hasta el plano de ecuación $x_1 + x_2 - x_3 = 5$.

(b) Encontrar el punto sobre la recta de intersección de los dos planos

$$x_1 + x_2 + x_3 = 3 \quad \text{y} \quad 2x_1 + 6x_2 - x_3 = 0$$

que está más cerca del origen.

(c) Mostrar que el volumen del mayor paralelepípedo rectangular que puede inscribirse en el elipsoide

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{25} = 1$$

es $240/3\sqrt{3}$.

16. Hallar la distancia mínima desde el origen al cono

$$z^2 = (x - 1)^2 + (y - 2)^2.$$

17. Encontrar tres números x, y, z tales que $x + y + z = 1$ y $xy + xz + yz$ sea tan grande como sea posible.

18. Encontrar el punto de la superficie $z = xy - 1$ más cercano al origen.

19. Demostrar la siguiente desigualdad:

$$\frac{x + y + z}{3} \geq \sqrt[3]{xyz}, \quad \forall x, y, z \geq 0.$$

Sugerencia: Buscar el máximo de la función $u = xyz$ con la condición $x + y + z = c$.