

## Análisis II - Matemática 3

### PRÁCTICA 3 - CAMBIO DE VARIABLES Y APLICACIONES

1. Sean  $D^* = \{(r, \theta) : 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta < 2\pi\}$ ,  $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$  y  $T$  la transformación de coordenadas polares a cartesianas, es decir,  $T(r, \theta) = (x(r, \theta), y(r, \theta)) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ .
  - (a) Mostrar que  $T(D^*) = D$ . ¿Es biyectiva  $T$ ?
  - (b) ¿En que transforma  $T$  el rectángulo  $[r, r + \Delta r] \times [\theta, \theta + \Delta \theta]$ ?
  - (c) Calcular la matriz  $DT(r, \theta)$ . ¿En que transforma la aplicación dada por esta matriz al rectángulo dado en b)? ¿Y en el caso  $r = 0$ ?
  - (d) Escribir la demostración de la fórmula de cambio de variables en este caso (haciendo los dibujos correspondientes).
  
2. Sean  $D_1 = \{(r, \theta) : 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta < 4\pi\}$  y  $T$  la transformación del ejercicio anterior.
  - (a) Hallar  $D = T(D_1)$ .
  - (b) Calcular  $\int_D (x^2 + y^2) dx dy$  y  $\int_{D_1} r^2 J dr d\theta$  siendo  $J$  el jacobiano de la transformación. ¿Dan igual las dos integrales? ¿Por qué?
  
3. Sea  $T(u, v) = (x(u, v), y(u, v)) = (4u, 2u + 3v)$ . Sea  $D^*$  el rectángulo  $[0, 1] \times [1, 2]$ . Hallar  $D = T(D^*)$  y calcular:
  - (a)  $\int_D xy dx dy$
  - (b)  $\int_D (x - y) dx dy$
 haciendo un cambio de variables para transformarlas en integrales sobre  $D^*$ .
  
4. Repetir el ejercicio 3 para  $T(u, v) = (u, v(1 + u))$ .
  
5. Sean  $T(u, v) = (u^2 - v^2, 2uv)$  y  $D^* = \{(u, v) : u^2 + v^2 \leq 1, u \geq 0, v \geq 0\}$ . Hallar  $D = T(D^*)$  y calcular su área.
  
6. Sean  $T(u, v)$  y  $D$  los del ejercicio anterior. Calcular:

$$\int_D \frac{dx dy}{\sqrt{(x^2 + y^2)}}$$

haciendo ese cambio de variables.

7. Calcular  $\int_D (x^2 + y^2)^{3/2} dx dy$  donde  $D$  es el disco de centro en el origen y radio 2.
8. Hallar el área dentro de la curva  $r = 1 + \sin \theta$ .

9. Dado el paralelogramo  $P$  del plano  $xy$  con vértices  $(0,0)$ ,  $(2,10)$ ,  $(3,17)$  y  $(1,7)$ ,
- (a) Hallar una transformación lineal que convierta a  $P$  en un rectángulo  $R$  del plano  $uv$  con vértices opuestos en  $(0,0)$  y  $(4,2)$ .
- (b) Calcular la integral  $\int_P xy \, dx \, dy$  transformándola en una integral sobre el rectángulo  $R$ .

10. Es sabido, aunque difícil de demostrar, que una primitiva de la función  $e^{-x^2}$  no puede expresarse en términos de las funciones elementales usuales. Esto dificulta el cálculo de  $\int_a^b e^{-x^2} \, dx$ . Sin embargo, el siguiente truco notable permite calcular de manera simple la integral impropia  $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a e^{-x^2} \, dx$ :

(a) Observar que  $I^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} \, dx \, dy$

- (b) Calcular la integral de (a) como límite de integrales en círculos utilizando coordenadas polares.

11. Integrar  $ze^{x^2+y^2}$  sobre el cilindro dado por  $x^2 + y^2 \leq 4$ ,  $2 \leq z \leq 4$ .

12. Hallar el área acotada por la curva dada por la ecuación

$$(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2).$$

Esta curva se llama lemniscata. ¿Por qué?

13. Calcular el volumen de un cilindro con base circular de radio  $r$  y altura  $h$ .

14. (a) Calcular el volumen  $V(R)$  de una esfera  $B_R$  de radio  $R$ .

- (b) Llamando  $\partial B_R$  a la superficie del borde de la esfera  $B_R$  y  $A(\partial B_R)$  a su área, demostrar que  $\frac{dV(R)}{dR} = A(\partial B_R)$  y deducir el valor del área de dicha superficie.

15. Integrar  $x^2 + y^2 + z^2$  sobre el cilindro dado por  $x^2 + y^2 \leq 2$ ,  $-2 \leq z \leq 3$ .

16. Sea  $B$  la bola unitaria, es decir,  $B = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ . Calcular:

$$\int_B \frac{dx \, dy \, dz}{\sqrt{2 + x^2 + y^2 + z^2}}.$$

17. Calcular  $\int_A \frac{1}{(x^2+y^2)^2} \, dx \, dy$ , donde  $A$  está determinado por las condiciones  $x^2 + y^2 \leq 1$  y  $x + y \geq 1$ .

18. Calcular:

$$\int_S \frac{dx \, dy \, dz}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

donde  $S$  es el sólido acotado por dos esferas de radios  $a$  y  $b$  con  $0 < b < a$  y centradas en el origen.

19. Calcular  $\int_B z \, dx \, dy \, dz$  donde  $B$  es la región sobre el plano  $xy$  dentro del cilindro dado por  $x^2 + y^2 \leq 1$  y debajo del cono dado por  $z = (x^2 + y^2)^{1/2}$ .
20. Sea  $E$  el elipsoide dado por  $(x^2/a^2) + (y^2/b^2) + (z^2/c^2) \leq 1$ .
- (a) Hallar el volumen de  $E$ .
- (b) Calcular  $\int_E [(x^2/a^2) + (y^2/b^2) + (z^2/c^2)] \, dx \, dy \, dz$ .
21. Calcular el volumen del cuerpo definido por  $x^2 + z^2 \geq 4$  y  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$
22. Hallar el volumen de la región encerrada por las superficies  $z = x^2 + y^2$  y  $z = 10 - x^2 - 2y^2$ .
23. Hallar la masa del sólido acotado por el cilindro  $x^2 + y^2 = 2x$  y el cono  $z^2 = x^2 + y^2$  si la densidad es  $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ .
24. Hallar el centro de masa del cilindro  $x^2 + y^2 \leq 1$ ,  $1 \leq z \leq 2$ , si la densidad es  $\rho = (x^2 + y^2)z^2$ .
25. Si un sólido  $W$  tiene densidad uniforme  $\rho$ , el momento de inercia alrededor del eje  $x$  está definido por,

$$I_x = \int_W \rho(y^2 + z^2) \, dx \, dy \, dz$$

y análogamente se definen  $I_y$  e  $I_z$ . Sea ahora  $W$  el sólido con densidad constante acotado por arriba por el plano  $z = a$  y por debajo por el cono descrito en coordenadas esféricas por  $\phi = k$ , donde  $k$  es una constante tal que  $0 < k < \pi/2$ . Dar una integral para su momento de inercia alrededor del eje  $z$ .

26. Hallar el momento de inercia alrededor del eje  $y$  para la bola  $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$  si la densidad de masa es una constante  $\rho$ .
27. Dado un sólido  $W$  con densidad de masa  $\rho(x, y, z)$ , la fuerza gravitacional  $\mathbf{F}$  que ejerce  $W$  sobre una masa  $m$  en  $(x_1, y_1, z_1)$  está dada por el gradiente de una función  $V$  llamada *potencial gravitacional*, es decir,  $\mathbf{F} = -\nabla V$ . Este *potencial gravitacional* está dado por,

$$V(x_1, y_1, z_1) = Gm \int_W \frac{\rho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz}{\sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2}}$$

donde  $G$  es la constante de gravitación universal.

- (a) Hallar el potencial gravitacional sobre una masa  $m$  de un planeta esférico con una masa  $M = 3 \cdot 10^{26}$  kg, a una distancia de  $2 \cdot 10^8$  m de su centro.
- (b) Hallar la fuerza gravitacional ejercida sobre un objeto de 70 kg en la posición indicada en (a).