

ANÁLISIS COMPLEJO

Práctica N°1.

1. Expresar los siguientes números complejos en la forma $a + ib$, con $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\begin{array}{lll} \text{(i)} & (i+1)(i-1)(i+3), & \text{(ii)} \quad (3-2i)^2, & \text{(iii)} \quad \frac{1}{-1+3i}, \\ \text{(iv)} & \frac{1+i}{i}, & \text{(v)} \quad \frac{2+i}{2-i}, & \text{(vi)} \quad (1+i)^{100}, \\ \text{(vii)} & (1+i)^{65} + (1-i)^{65}. & & \end{array}$$

2. Sean z y w dos números complejos. Demostrar que:

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} & \bar{z} = z \text{ si y solo si } z \in \mathbb{R}, & \text{(b)} \quad \overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}, & \text{(c)} \quad \overline{z\bar{w}} = \bar{z} w, \\ \text{(d)} & \operatorname{Re}(z) = \frac{z+\bar{z}}{2}, & \text{(e)} \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{z-\bar{z}}{2i}. & \end{array}$$

3. Probar que si $z_0 \in \mathbb{C}$ es raíz de $a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_0 = 0$, entonces $\bar{z}_0 \in \mathbb{C}$ es raíz de $\bar{a}_n X^n + \bar{a}_{n-1} X^{n-1} + \dots + \bar{a}_0 = 0$. Deducir que si $P(X)$ es un polinomio con coeficientes reales y $z_0 \in \mathbb{C}$ es raíz de $P(X)$, entonces $\bar{z}_0 \in \mathbb{C}$ también lo es.

4. Para $z \in \mathbb{C}$, se define $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$. Probar que:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & \text{Si } z = a + bi, |z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \\ \text{(b)} & |zw| = |z||w| \text{ y } \left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|}, \\ \text{(c)} & -|z| \leq \operatorname{Re}(z) \leq |z| \text{ y } -|z| \leq \operatorname{Im}(z) \leq |z|, \\ \text{(d)} & |z+w|^2 = |z|^2 + |w|^2 + 2\operatorname{Re}(z \cdot \bar{w}) \text{ y } |z-w|^2 = |z|^2 + |w|^2 - 2\operatorname{Re}(z \cdot \bar{w}), \\ \text{(e)} & |z+w|^2 + |z-w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2), \\ \text{(f)} & |z+w| \leq |z| + |w| \text{ y } |z-w| \geq ||z| - |w||. \end{array}$$

Interpretar geoméricamente la propiedad (e), también conocida como “Ley del paralelogramo”.

5. Probar que $d : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $d(z, w) = |z - w|$ es una métrica.

6. Sea $\alpha = a + bi \in \mathbb{C}$ y $c > 0$. Para $z = x + iy$, transformar la condición $|z - \alpha| = c$ en una ecuación que involucre solo a x, y, a, b y c ; describir qué figura geométrica representa esta ecuación.

7. Describir geoméricamente los siguientes subconjuntos de \mathbb{C} :

$$\begin{array}{ll} \text{(i)} & |z - i + 3| = 5, & \text{(ii)} & |z - i + 3| \leq 5, \\ \text{(iii)} & \operatorname{Re}(2z + 3) \geq 0 & \text{(iv)} & \operatorname{Re}((1 + 2i)z) \geq 0. \end{array}$$

8. **Definición:** $e^{a+bi} = e^a \cdot (\cos b + i \operatorname{sen} b)$.

- (a) Demostrar que para todo $z, w \in \mathbb{C}$, $e^{w+z} = e^w e^z$.
- (b) Describir los z tales que $e^z = 1$.
- (c) Demostrar que si $e^z = e^w$, entonces existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $z = w + 2k\pi i$.

9. (a) Pasar de la forma $a + ib$ a la forma polar:

$$(i) \quad 1 + i, \quad (ii) \quad -5i, \quad (iii) \quad -3.$$

(b) Pasar de la forma polar a la forma $a + ib$:

$$(i) \quad 3e^{i\frac{\pi}{4}}, \quad (ii) \quad e^{-i\pi}, \quad (iii) \quad \pi e^{-i\frac{\pi}{3}}.$$

10. (a) Para $n = 2, 3, 4, 5$, dibujar todos los números complejos z tales que $z^n = 1$.

(b) Sea $n \in \mathbb{N}$ y $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Mostrar que hay n números complejos distintos tales que $z^n = \alpha$.

11. (a) Sea $\theta \in \mathbb{R}$. Mostrar que $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ y $\operatorname{sen} \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$.

(b) Generalizando las igualdades del ítem anterior, se define para $z \in \mathbb{C}$,

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad \text{y} \quad \operatorname{senz} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

Mostrar que los únicos valores de z para los cuales $\cos z = 0$ y $\operatorname{senz} = 0$ son los valores reales usuales.

12. Sea $z \neq 1$. Probar que $1 + z + \dots + z^n = \frac{z^{n+1} - 1}{z - 1}$. Para $0 < \theta < 2\pi$, dar una fórmula para la suma $1 + \cos \theta + \dots + \cos n\theta$.

13. Demostrar que para todo par de números reales positivos a, b , vale que

$$\arctan\left(\frac{1}{a+b}\right) + \arctan\left(\frac{b}{a^2 + ab + 1}\right) = \arctan\left(\frac{1}{a}\right).$$

Sucesiones

14. (a) Probar que si $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z$ entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = |z|$.

(b) Dar un ejemplo donde no valga la recíproca.

15. (a) Sea $\alpha \in \mathbb{C}$, $|\alpha| < 1$. ¿Cuánto vale $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha^n$? Demostrarlo.

(b) Idem para $|\alpha| > 1$.

(c) Si $|\alpha| < 1$, probar que $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \alpha + \dots + \alpha^n) = \frac{1}{1-\alpha}$.

16. Calcular, en caso de que existan, los límites de las siguientes sucesiones:

$$(i) \quad \frac{1}{n} \left(\frac{1+i}{2}\right)^n, \quad (ii) \quad n \left(\frac{1+i}{2}\right)^n, \quad (iii) \quad \cos(n\pi) + i \frac{\operatorname{sen}(\frac{n}{2})}{n^2},$$
$$(iv) \quad \left(\frac{(-1)^{n+1}}{3}\right)^n, \quad (v) \quad ni^{2n+1}.$$

17. Para $|z| \neq 1$, mostrar que el límite $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{z^n - 1}{z^n + 1}\right)$ existe. Si llamamos $f(z)$ al valor del límite anterior ¿es posible definir $f(z)$ para $|z| = 1$ de manera continua?

18. Se define el *conjunto de Mandelbrot* como el conjunto \mathcal{M} de los números complejos c tales que la sucesión definida de manera recursiva del siguiente modo:

$$z_0 = c, \quad z_{n+1} = z_n^2 + c,$$

resulta acotada. Demostrar que $\mathcal{M} \subset \{|z| \leq 2\}$.

Plano Complejo ampliado - Esfera de Riemann

19. Sean $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ y $S = S^2$ (la esfera en \mathbb{R}^3 de radio 1 y centro en $(0, 0, 0)$). Sea $N = (0, 0, 1) \in S$, definimos la proyección estereográfica $\theta : S \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ haciendo $\theta(N) = \infty$ y dado $P \in S \setminus \{N\}$, $\theta(P) = a + ib$ sii $(a, b, 0)$ es el punto de intersección de la recta $\overline{NP} \subset \mathbb{R}^3$ con el plano $x_3 = 0$.

(a) Probar que $\theta(x_1, x_2, x_3) = \frac{x_1 + ix_2}{1 - x_3}$ si $(x_1, x_2, x_3) \neq N$.

(b) Probar que θ es una biyección y su inversa φ está dada por

$$\varphi(z) = \left(\frac{2\operatorname{Re}(z)}{1 + |z|^2}, \frac{2\operatorname{Im}(z)}{1 + |z|^2}, \frac{|z|^2 - 1}{1 + |z|^2} \right).$$

(c) Calcular $\varphi(\operatorname{Re}(z) = 0)$ y $\varphi(\operatorname{Im}(z) = 0)$.

20. Sea \bar{d} la distancia en $\widehat{\mathbb{C}}$ inducida por la distancia de \mathbb{R}^3 vía θ , es decir, si $z, z' \in \widehat{\mathbb{C}}$, definimos $\bar{d}(z, z') = d(\varphi(z), \varphi(z'))$ donde d es la distancia euclídea.

(a) Verificar que \bar{d} es una métrica en $\widehat{\mathbb{C}}$.

(b) Probar que la métrica usual en \mathbb{C} es equivalente a la inducida en \mathbb{C} por \bar{d} (probar, por ejemplo, que (\mathbb{C}, \bar{d}) y (\mathbb{C}, d_{usual}) tienen las mismas sucesiones convergentes).

(c) Verificar que $\bar{d}(z, w) = \frac{2|w-z|}{(1+|z|^2)^{\frac{1}{2}}(1+|w|^2)^{\frac{1}{2}}}$ para $z, w \in \mathbb{C}$ y $\bar{d}(z, \infty) = \frac{2}{(1+|z|^2)^{\frac{1}{2}}}$ para $z \in \mathbb{C}$.

(d) Probar que $(\widehat{\mathbb{C}}, \bar{d})$ es un espacio métrico compacto (y por lo tanto completo).

21. Sea C una circunferencia contenida en S y sea π el único plano en \mathbb{R}^3 tal que $\pi \cap S = C$. Mostrar que si C pasa por N entonces su proyección en \mathbb{C} es una recta y, en caso contrario, una circunferencia.

Homografías

Definición: Una *homografía* es una función $T : \widehat{\mathbb{C}} \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ del tipo $T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ donde $ad - bc \neq 0$.

22. Probar que el conjunto \mathcal{H} de las homografías es un grupo bajo la composición.

23. Sean $A, B \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$ no singulares que representan las homografías T_1 y T_2 respectivamente.

(a) ¿Qué homografía representa la matriz AB ?

(b) ¿Qué homografía representa la matriz A^{-1} ?

(c) ¿Qué homografías representan las matrices diagonales?

(d) ¿Cuándo dos matrices distintas representan la misma homografía?

24. Sean z_2, z_3, z_4 puntos distintos de $\widehat{\mathbb{C}}$. Probar que existe una única homografía T tal que $T(z_2) = 0$, $T(z_3) = 1$ y $T(z_4) = \infty$. Deducir que dados puntos distintos w_2, w_3, w_4 de $\widehat{\mathbb{C}}$ hay una única homografía que aplica z_2 en w_2 , z_3 en w_3 y z_4 en w_4 .

25. Demostrar que una homografía $T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ aplica \mathbb{R} en \mathbb{R} si y solo si se puede escribir con coeficientes reales.

26. **Definición:** Dados z_1, z_2, z_3, z_4 puntos distintos de $\widehat{\mathbb{C}}$, definimos la *razón doble* (z_1, z_2, z_3, z_4) por

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = \frac{z_1 - z_2}{z_1 - z_4} \cdot \frac{z_3 - z_4}{z_3 - z_2}.$$

Observar que (z_1, z_2, z_3, z_4) es la imagen de z_1 bajo la homografía T tal que $T(z_2) = 0$, $T(z_3) = 1$ y $T(z_4) = \infty$.

(a) Probar que si $T \in \mathcal{H}$ entonces $(T(z_1), T(z_2), T(z_3), T(z_4)) = (z_1, z_2, z_3, z_4)$.

(b) Demostrar que z_1, z_2, z_3, z_4 están en una recta o circunferencia si y solo si $(z_1, z_2, z_3, z_4) \in \mathbb{R}$.

27. **Definición:** Sea C una circunferencia de $\widehat{\mathbb{C}}$ y z_2, z_3, z_4 puntos de C . Dos puntos z y z^* se dicen *simétricos* respecto de C si $(z, z_2, z_3, z_4) = (z^*, z_2, z_3, z_4)$.

(a) Probar que la definición anterior no depende de los puntos elegidos z_2, z_3, z_4 sino de C .

(b) Probar que cada punto $z \in \widehat{\mathbb{C}}$ tiene un solo punto z^* simétrico respecto de C . A la aplicación que a cada $z \in \widehat{\mathbb{C}}$ le asigna su simétrico respecto de C se la llama *simetría respecto de C* . Probar que para cada homografía T que aplica \mathbb{R} en C , la función

$$T \circ \overline{T^{-1}} : \widehat{\mathbb{C}} \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$$

es la simetría respecto de C .

(c) Probar que si S es una homografía y z, z^* son simétricos respecto de una circunferencia C , entonces $S(z)$ y $S(z^*)$ son simétricos respecto de $S(C)$.

28. Probar que el simétrico del centro de una circunferencia C (respecto a C) es ∞ .

29. Interpretar geoméricamente la noción de simetría en el caso en que C sea una recta.

30. Para $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| \neq 1$, demostrar que la homografía

$$T(z) = \frac{z - \alpha}{-\overline{\alpha}z + 1}$$

transforma a la circunferencia $\{|z| = 1\}$ en si misma y a α en 0 ($|\alpha| \neq 1$).

31. Dados tres puntos distintos z_1, z_2 y z_3 en \mathbb{C} , demostrar que existe una única recta o circunferencia que pasa por z_1 y hace que z_2 y z_3 sean simétricos.

32. Hallar homografías que transformen

(a) los puntos $0, i, -i$ en $1, -1, 0$;

(b) la circunferencia $|z| = 2$ en $|z + 1| = 1$ y además -2 en 0 y 0 en i ;

(c) el semiplano superior $\text{Im}(z) > 0$ en $|z| < 1$ y α en 0 (donde $\text{Im}(\alpha) > 0$).

33. (a) Hallar todas las homografías cuyos únicos puntos son 0 e ∞ .

(b) Hallar todas las homografías que tienen un único punto fijo.

34. Sea $S(z) = \frac{7z+15}{-2z-4}$. Sea $z_1 = 1$ y $z_n = S(z_{n-1})$ para $n \geq 2$. Hallar $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n$.