

ANÁLISIS COMPLEJO

Práctica N°3.

1. Estudiar la convergencia de la serie cuyo término general es el siguiente:

$$\begin{array}{lll} \text{(i)} & a_n = \frac{n+1}{2n+1}, & \text{(ii)} & a_n = \frac{n}{2n^2+3}, & \text{(iii)} & a_n = \frac{1}{\sqrt{n+5}}, \\ \text{(iv)} & a_n = \log\left(1 + \frac{1}{n}\right), & \text{(v)} & a_n = \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{array}$$

2. Demostrar que la serie de término general $a_n = \frac{1}{n^p \log(n)^q}$, $n \geq 2$,

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & \text{converge si } q > 0 \text{ y } p > 1, & \text{(b)} & \text{converge si } q > 1 \text{ y } p = 1, \\ \text{(c)} & \text{diverge si } q > 0 \text{ si } p < 1, & \text{(d)} & \text{diverge si } 0 < q \leq 1 \text{ y } p = 1. \end{array}$$

3. Hallar el radio de convergencia de las siguientes series de potencia:

$$\begin{array}{lll} \text{(i)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^3 4^n} z^n, & \text{(ii)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1+2i)^n}{n^n} z^n, & \text{(iii)} & \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n^2} z^n, \\ \text{(iv)} & \sum_{n=1}^{\infty} 4^{n^2} z^n, & \text{(v)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} z^{n^2}, & \text{(vi)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} z^n. \end{array}$$

4. **Criterio de Weierstrass.** Sea X un espacio métrico y para cada $n \in \mathbb{N}$ sea $u_n : X \rightarrow \mathbb{C}$ una función tal que $|u_n(x)| \leq M_n$ para todo $x \in X$. Demostrar que

$$\sum_{n=1}^{\infty} M_n \text{ converge} \implies \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ converge uniformemente en } X.$$

5. Sean $(a_n)_{n \geq 0}$, $(Z_n)_{n \geq 0}$ sucesiones de números complejos tales que $(a_n Z_n)_{n \geq 0}$ converge. Demostrar que

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) Z_n \text{ converge} \iff \sum_{n=1}^{\infty} a_n (Z_n - Z_{n-1}) \text{ converge.}$$

6. Sean $(a_n)_{n \geq 1}$ y $(z_n)_{n \geq 1}$ sucesiones de números complejos.

(a) **Criterio de Dedekind.** Demostrar que si $\lim a_n = 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1})$ converge absolutamente y las sumas parciales de $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ están acotadas (es decir, existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $|\sum_{n=1}^k z_n| \leq M$ para todo $k \in \mathbb{N}$) entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n z_n$ converge.

(b) **Criterio de Bois-Reymond.** Demostrar que si $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1})$ converge absolutamente y $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n z_n$ converge.

(Sugerencia: usar el ejercicio anterior.)

7. **Criterio de Dirichlet.** Sea $(r_n)_{n \geq 1}$ una sucesión decreciente de números reales positivos tal que $\lim r_n = 0$ y $(z_n)_{n \geq 1}$ una sucesión de números complejos. Demostrar que si las sumas parciales de $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ están acotadas, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} r_n z_n$ converge. (Sugerencia: usar el criterio de Dedekind.)

8. Hallar el radio de convergencia de las siguientes series y estudiar el comportamiento en el borde del disco de convergencia:

$$\begin{array}{lll}
 \text{(i)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} z^n, & \text{(ii)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+2}} z^n, & \text{(iii)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n+1}} z^n, \\
 \text{(iv)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{5^n} z^n, & \text{(v)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)^n} z^n, & \text{(vi)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2-i)^{n^2}} z^n, \\
 \text{(vii)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+(1+i)^n} z^n, & \text{(viii)} & \sum_{n=1}^{\infty} n! z^{n^2}, & \text{(ix)} & \sum_{n=1}^{\infty} z^{n!}, \\
 \text{(x)} & \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sen} n z^n, & \text{(xi)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} z^{n(n+1)}.
 \end{array}$$

9. Hallar los valores de z para los cuales las siguientes series resultan convergentes:

$$\begin{array}{lll}
 \text{(i)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z+i)^n}{(n+1)(n+2)}, & \text{(ii)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+|z|}, & \text{(iii)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+|z|}, \\
 \text{(iv)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 z^{2n}}{7^n}, & \text{(v)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n z^n}, & \text{(vi)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{nz}}{n^2}, \\
 \text{(vii)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{inz}}{n+1}, & \text{(viii)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \left(\frac{z+1}{z-1} \right)^n, & \text{(ix)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{z-\alpha}{1-\bar{\alpha}z} \right)^n, \quad |\alpha| < 1.
 \end{array}$$

10. Para $m \in \mathbb{N}$ fijo, probar que los conjuntos de convergencia de las series $\sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} a_{m+n} z^n$ son iguales.

11. Probar que si el radio de convergencia de $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ es $\rho > 0$, entonces el de $\sum_{n=0}^{\infty} a_n n^k z^n$ es también ρ para todo $k \in \mathbb{N}$.

12. Hallar los términos de orden ≤ 3 en el desarrollo en serie de potencias de las siguientes funciones:

$$\begin{array}{lll}
 \text{(i)} & e^z \operatorname{sen} z, & \text{(ii)} & \operatorname{sen} z \cos z, & \text{(iii)} & \frac{e^z - 1}{z}, \\
 \text{(iv)} & \frac{e^z - \cos z}{z}, & \text{(v)} & \frac{1}{\cos z}, & \text{(vi)} & \frac{\operatorname{sen} z}{\cos z}.
 \end{array}$$

13. Para $n \in \mathbb{N}$, hallar el desarrollo en serie de potencias de la función $f_n(z) = \frac{1}{(1+z)^n}$. (Sugerencia: $f_n = \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} f_1^{(n-1)}$.)

14. Sea $f(z) = \sum_n a_n z^n$ una serie de potencias con radio de convergencia $\rho > 0$. Se dice que $f(z)$ es *par* (*impar*) si $a_n = 0$ para todo n impar (par). Mostrar que

- f es par sii $f(-z) = f(z)$ para todo z con $|z| < \rho$,
- f es impar sii $f(-z) = -f(z)$ para todo z con $|z| < \rho$.

15. La *sucesión de Fibonacci* se define recursivamente por $a_0 = 0$, $a_1 = 1$ y $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ para $n \geq 2$.

- (a) Probar que $R(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ converge en un entorno del origen, y la función $R(z)$ es una función racional. Hallar una fórmula explícita para $R(z)$.
- (b) Descomponiendo $R(z)$ en fracciones simples y usando la suma de la serie geométrica, obtener un nuevo desarrollo de $R(z)$ en serie de potencias.
- (c) Comparar ambos desarrollos y obtener una fórmula cerrada para el n -ésimo término de la sucesión de Fibonacci.