
PRÁCTICA 1

1. Expresar los siguientes números complejos en la forma $a + bi$, con $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\begin{array}{lll}
 \text{(i)} & (i+1)(i-1)(i+3) & \text{(ii)} \quad (3-2i)^2 & \text{(iii)} \quad \frac{1}{-1+3i} \\
 \text{(iv)} & \frac{1+i}{i} & \text{(v)} \quad \frac{2+i}{2-i} & \text{(vi)} \quad (1+i)^{100} \\
 \text{(vii)} & (1+i)^{65} + (1-i)^{65} & &
 \end{array}$$

2. Sean z y w dos números complejos. Demostrar que:

$$\begin{array}{lll}
 \text{(a)} & \bar{z} = z \text{ si y sólo si } z \in \mathbb{R} & \text{(b)} \quad \overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w} & \text{(c)} \quad \overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w} \\
 \text{(d)} & \operatorname{Re}(z) = \frac{z+\bar{z}}{2} & \text{(e)} \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{z-\bar{z}}{2i} &
 \end{array}$$

3. Probar que si $z \in \mathbb{C}$ es raíz de $a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_0$, entonces \bar{z} es raíz de $\bar{a}_n X^n + \bar{a}_{n-1} X^{n-1} + \dots + \bar{a}_0$. Deducir que si $P(X)$ es un polinomio con coeficientes reales y $z \in \mathbb{C}$ es raíz de $P(X)$, entonces \bar{z} también lo es.

4. Hallar todas las soluciones en \mathbb{C} de la ecuación $iz^2 + (3-i)z - (1+2i) = 0$.

5. Dado $z \in \mathbb{C}$, se define $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$. Probar que:

$$\begin{array}{l}
 \text{a)} \quad \text{si } z = a + bi, \text{ entonces } |z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \\
 \text{b)} \quad |z \cdot w| = |z| \cdot |w|, \text{ y si } w \neq 0, \left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|}, \\
 \text{c)} \quad -|z| \leq \operatorname{Re}(z) \leq |z| \text{ y } -|z| \leq \operatorname{Im}(z) \leq |z|, \\
 \text{d)} \quad |z+w|^2 = |z|^2 + |w|^2 + 2\operatorname{Re}(z\bar{w}) \text{ y } |z-w|^2 = |z|^2 + |w|^2 - 2\operatorname{Re}(z\bar{w}), \\
 \text{e)} \quad |z+w|^2 + |z-w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2), \\
 \text{f)} \quad |z+w| \leq |z| + |w| \text{ y } |z-w| \geq |z| - |w|.
 \end{array}$$

Interpretar geoméricamente el ítem e), conocido como "Ley del paralelogramo".

6. Probar que $d: \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $d(z, w) = |z - w|$ es una métrica.

7. Sean $\alpha = a + bi \in \mathbb{C}$ y $c \in \mathbb{R}_{>0}$. Para $z = x + yi$, transformar la condición $|z - \alpha| = c$ en una ecuación que involucre sólo a x, y, a, b y c ; describir qué figura geométrica representa esta ecuación.

8. Describir geoméricamente los siguientes subconjuntos de \mathbb{C} .

$$\begin{array}{ll}
 \text{(i)} & |z - i + 3| = 5 & \text{(ii)} & |z - i + 3| \leq 5 \\
 \text{(iii)} & \operatorname{Re}(2z + 3) \geq 0 & \text{(iv)} & \operatorname{Re}((1 + 2i)z) \geq 0
 \end{array}$$

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS Y EXPONENCIAL

Definición: Dado $z = a + bi \in \mathbb{C}$, se define $e^z = e^a \cdot (\cos b + i \operatorname{sen} b)$.

9. a) Demostrar que para todo $z, w \in \mathbb{C}$ vale $e^{w+z} = e^w e^z$.
 b) Describir los z tales que $e^z = 1$.
 c) Demostrar que si $e^z = e^w$ entonces existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $z = w + 2k\pi i$.
 d) Probar que para todo $z \in \mathbb{C}$ vale $e^{\bar{z}} = \overline{e^z}$.
10. a) Pasar de la forma binomial a la forma polar:
 (i) $1 + i$ (ii) $-5i$ (iii) -3
- b) Pasar de la forma polar a la forma binomial:
 (i) $3e^{i\frac{\pi}{4}}$ (ii) $e^{-i\pi}$ (iii) $\pi e^{-i\frac{\pi}{3}}$
11. a) Para $n = 2, 3, 4, 5$, dibujar todos los números complejos z tales que $z^n = 1$.
 b) Sea $n \in \mathbb{N}$ y $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Mostrar que hay n números complejos distintos tales que $z^n = \alpha$.
12. Sea $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = e^z$.
 a) Mostrar que f tiene período $2\pi i$.
 b) Hallar la imagen por f del conjunto $\{z \in \mathbb{C} \mid 0 \leq \text{Im}(z) < 2\pi\}$.
 c) Hallar la imagen por f del primer cuadrante.
 d) Describir geoméricamente la imagen por f de la recta $\{t + it \mid t \in \mathbb{R}\}$.
13. a) Sea $\theta \in \mathbb{R}$. Mostrar que $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ y $\text{sen } \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$.
Definición: Generalizando estas igualdades, se define para $z \in \mathbb{C}$,
- $$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad \text{y} \quad \text{sen } z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$
- b) Comprobar que para todo $z \in \mathbb{C}$,
- $$\cos^2(z) + \text{sen}^2(z) = 1 \quad \text{y} \quad e^{iz} = \cos z + i \text{sen } z.$$
- c) Mostrar que $\text{sen } z$ y $\cos z$ tienen período 2π .
 d) Mostrar que los únicos valores de z para los cuales $\cos z = 0$ y $\text{sen } z = 0$ son los valores reales usuales.
 e) Probar que para todo $z \in \mathbb{C}$, $\cos(\bar{z}) = \overline{\cos(z)}$ y $\text{sen}(\bar{z}) = \overline{\text{sen}(z)}$
14. Hallar todos los $z \in \mathbb{C}$ tales que $\cos z \in \mathbb{R}$ y los $z \in \mathbb{C}$ tales que $\text{sen } z \in \mathbb{R}$.
15. a) Probar que $\cos z$ y $\text{sen } z$ son funciones suryectivas de \mathbb{C} en \mathbb{C} .
 b) Hallar todas las soluciones de la ecuación $\cos z = \frac{5}{4}$.

16. Sean $a, b, b' \in \mathbb{R}$. Probar que si $|b| < |b'|$, entonces $|\cos(a + bi)| < |\cos(a + b'i)|$ y $|\operatorname{sen}(a + bi)| < |\operatorname{sen}(a + b'i)|$.
17. Sea $z \neq 1$. Probar que $1 + z + \dots + z^n = \frac{z^{n+1} - 1}{z - 1}$. Para $0 < \theta < 2\pi$, dar una fórmula para la suma $1 + \cos \theta + \dots + \cos n\theta$.
18. Demostrar que para todo par de números reales positivos a, b vale la siguiente identidad.

$$\arctan\left(\frac{1}{a+b}\right) + \arctan\left(\frac{b}{a^2 + ab + 1}\right) = \arctan\left(\frac{1}{a}\right).$$

SUCESIONES

19. Sean $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ y $z \in \mathbb{C}$.

a) Probar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z \iff \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Re}(z_n) = \operatorname{Re}(z) \text{ y } \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Im}(z_n) = \operatorname{Im}(z) \right).$$

b) Probar que si $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z$ entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = |z|$.

c) Dar un ejemplo donde no valga la recíproca.

20. a) Sea $\alpha \in \mathbb{C}$, $|\alpha| < 1$. ¿Cuánto vale $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha^n$? Repetir para $|\alpha| > 1$.

b) Si $|\alpha| < 1$, probar que $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \alpha + \dots + \alpha^n) = \frac{1}{1 - \alpha}$.

21. Calcular, en caso de que existan, los límites de las siguientes sucesiones:

$$\begin{array}{lll} \text{(i)} & \frac{1}{n} \left(\frac{1+i}{2}\right)^n, & \text{(ii)} \quad n \left(\frac{1+i}{2}\right)^n, & \text{(iii)} \quad \cos(n\pi) + i \frac{\operatorname{sen}(\frac{n}{2})}{n^2}, \\ \text{(iv)} & \left(\frac{(-1)^n + 1}{3}\right)^n, & \text{(v)} \quad ni^{2n+1}. \end{array}$$

22. Se define el *conjunto de Mandelbrot* como el conjunto \mathcal{M} de los números complejos c tales que la sucesión definida de manera recursiva del siguiente modo:

$$z_0 = c, \quad z_{n+1} = z_n^2 + c,$$

resulta acotada. Demostrar que $\mathcal{M} \subset \{|z| \leq 2\}$.

PLANO COMPLEJO AMPLIADO - ESFERA DE RIEMANN

23. Sean $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ y S^2 la esfera en \mathbb{R}^3 de radio 1 y centro en $(0, 0, 0)$. Sea $N = (0, 0, 1) \in S$. Definimos la proyección estereográfica $\theta : S^2 \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ haciendo $\theta(N) = \infty$ y dado $P \in S \setminus \{N\}$, $\theta(P) = a + ib$ sii $(a, b, 0)$ es el punto de intersección de la recta $\overline{NP} \subset \mathbb{R}^3$ con el plano $x_3 = 0$.

a) Probar que $\theta(x_1, x_2, x_3) = \frac{x_1 + ix_2}{1 - x_3}$ si $(x_1, x_2, x_3) \neq N$.

b) Probar que θ es una biyección y su inversa φ está dada por

$$\varphi(z) = \left(\frac{2\operatorname{Re}(z)}{1+|z|^2}, \frac{2\operatorname{Im}(z)}{1+|z|^2}, \frac{|z|^2-1}{1+|z|^2} \right).$$

c) Calcular $\varphi(\operatorname{Re}(z) = 0)$ y $\varphi(\operatorname{Im}(z) = 0)$.

24. Sea \bar{d} la distancia en $\widehat{\mathbb{C}}$ inducida por la distancia de \mathbb{R}^3 vía θ , es decir, si $z, z' \in \widehat{\mathbb{C}}$, definimos $\bar{d}(z, z') = d(\varphi(z), \varphi(z'))$ donde d es la distancia euclídea.

a) Verificar que \bar{d} es una métrica en $\widehat{\mathbb{C}}$. Probar que, restringida a \mathbb{C} , \bar{d} resulta equivalente a la métrica usual.

b) Para $z, w \in \mathbb{C}$, verificar que $\bar{d}(z, w) = \frac{2|w-z|}{(1+|z|^2)^{\frac{1}{2}}(1+|w|^2)^{\frac{1}{2}}}$ y $\bar{d}(z, \infty) = \frac{2}{(1+|z|^2)^{\frac{1}{2}}}$.

c) Probar que $(\widehat{\mathbb{C}}, \bar{d})$ es un espacio métrico compacto (y por lo tanto completo).

25. Sea C una circunferencia contenida en S . Mostrar que si C pasa por N entonces su proyección en \mathbb{C} es una recta, y si C no pasa por N entonces su proyección es una circunferencia.

HOMOGRAFÍAS

Definición: Una *homografía* es una función $T : \widehat{\mathbb{C}} \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ del tipo $T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ donde $ad - bc \neq 0$.

26. Probar que el conjunto \mathcal{H} de las homografías es un grupo bajo la composición.

27. Sean z_2, z_3, z_4 puntos distintos de $\widehat{\mathbb{C}}$. Probar que existe una única homografía T tal que $T(z_2) = 0$, $T(z_3) = 1$ y $T(z_4) = \infty$. Deducir que dados puntos distintos w_2, w_3, w_4 de $\widehat{\mathbb{C}}$ hay una única homografía que aplica z_2 en w_2 , z_3 en w_3 y z_4 en w_4 .

28. a) Hallar homografías que transformen

1) los puntos $0, i, -i$ en $0, 1, \infty$;

2) los puntos $0, i, -i$ en $1, -1, 0$.

b) Probar que la imagen de la circunferencia de centro 0 y radio 1 por la primer homografía del ítem anterior es la recta $\{\operatorname{Re}(z) = 1\}$.

29. Para $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| \neq 1$, demostrar que la homografía

$$T(z) = \frac{z - \alpha}{-\bar{\alpha}z + 1}$$

transforma a la circunferencia $\{|z| = 1\}$ en si misma y a α en 0.

30. Sean $A, B \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$ matrices no singulares que representan las homografías T_1 y T_2 respectivamente.

a) ¿Qué homografía representa la matriz AB ?

- b) ¿Qué homografía representa la matriz A^{-1} ?
- c) ¿Qué homografías representan las matrices diagonales?
- d) ¿Cuándo dos matrices distintas representan la misma homografía?
31. Demostrar que una homografía $T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ aplica $\widehat{\mathbb{R}}$ en $\widehat{\mathbb{R}}$ si y sólo si se puede escribir con coeficientes reales.

Definición: Dados z_1, z_2, z_3, z_4 puntos distintos de $\widehat{\mathbb{C}}$, definimos su *razón doble* (z_1, z_2, z_3, z_4) por

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = \frac{z_1 - z_2}{z_1 - z_4} \cdot \frac{z_3 - z_4}{z_3 - z_2}.$$

Observar que (z_1, z_2, z_3, z_4) es la imagen de z_1 bajo la homografía T tal que $T(z_2) = 0$, $T(z_3) = 1$ y $T(z_4) = \infty$.

32. a) Probar que si $T \in \mathcal{H}$ entonces $(T(z_1), T(z_2), T(z_3), T(z_4)) = (z_1, z_2, z_3, z_4)$.
- b) Demostrar que z_1, z_2, z_3, z_4 están en una recta o circunferencia si y sólo si $(z_1, z_2, z_3, z_4) \in \mathbb{R}$.

Definición: Sea C una recta o circunferencia de $\widehat{\mathbb{C}}$ y z_2, z_3, z_4 puntos de C . Dos puntos z y z^* se dicen *simétricos* respecto de C sii $(z, z_2, z_3, z_4) = (z^*, z_2, z_3, z_4)$.

33. a) Probar que la definición anterior no depende de los punto elegidos z_2, z_3, z_4 sino de C .
- b) Probar que cada punto $z \in \widehat{\mathbb{C}}$ tiene un solo punto z^* simétrico respecto de C . A la aplicación que a cada $z \in \widehat{\mathbb{C}}$ le asigna su simétrico respecto de C se la llama *simetría respecto de C* . Probar que para cada homografía T que aplica $\widehat{\mathbb{R}}$ en C , la función

$$T \circ \overline{T^{-1}} : \widehat{\mathbb{C}} \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$$

es la simetría respecto de C .

- c) Probar que si S es una homografía y z, z^* son simétricos respecto de una recta o circunferencia C , entonces $S(z)$ y $S(z^*)$ son simétricos respecto de $S(C)$.
34. Probar que el simétrico del centro de una circunferencia C (respecto a C) es ∞ .
35. Probar que en caso en que C sea una recta, esta nueva noción de simetría coincide con la simetría usual.
36. Dados tres puntos distintos z_1, z_2 y z_3 en $\widehat{\mathbb{C}}$, demostrar que existe una única recta o circunferencia que pasa por z_1 y hace que z_2 y z_3 sean simétricos.
37. Hallar homografías que transformen
- a) la circunferencia $|z| = 2$ en $|z + 1| = 1$ y además -2 en 0 y 0 en i ;
- b) el semiplano superior $\text{Im}(z) > 0$ en $|z| < 1$ y α en 0 (donde $\text{Im}(\alpha) > 0$).
38. Sea $S(z) = \frac{7z+15}{-2z-4}$. Sean $z_1 = 1$ y $z_n = S(z_{n-1})$ para $n \geq 2$. Hallar $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n$.