

Análisis Funcional - 1º cuatrimestre 2002

TOPOLOGÍAS DÉBILES

Recuerda que un guerrero no detiene jamás su marcha. L.A. Spinetta

1. Sea E un espacio de Banach, sean $x_n, x \in E$ tales que $x_n \xrightarrow{w} x$. Probar que $\|x_n\|$ está acotada y que $\|x\| \leq \liminf \|x_n\|$.
(Sug: usar Principio de Acotación uniforme y la inclusión canónica en el bidual)
2. Sean E un espacio de Banach, $x_n, x \in E$, $\varphi_n, \varphi \in E'$. Si $x_n \xrightarrow{w} x$ y $\varphi_n \rightarrow \varphi$ entonces $\varphi_n(x_n) \rightarrow \varphi(x)$.
3. Sean E un espacio de Banach, $x_n, x \in E$.
 - (a) Si $x_n \rightarrow x$ entonces $x_n \xrightarrow{w} x$.
 - (b) Si $\dim E < \infty$, $x_n \rightarrow x \Leftrightarrow x_n \xrightarrow{w} x$.
4. (a) Sea E un espacio de Banach, $\varphi : E \rightarrow \mathbb{C}$ lineal. φ es continua si y sólo si φ es continua de (E, w) en $\mathbb{C}$.
(b) Sean E y F espacios de Banach, $T : E \rightarrow F$ lineal. T es continua si y sólo si T es continua de (E, w) en (F, w) .
5. Sean E un espacio de Banach, $x_n, x \in E$. Si $x_n \xrightarrow{w} x$ entonces existe una sucesión de combinaciones convexas de $\{x_n\}$ que tiende fuertemente a x .
6. Sean E un espacio de Banach, $x_n \in E$. $\{x_n\}_n$ converge en E si y sólo si $\{x_n\}_n$ converge débil y uniformemente en $\{\varphi \in E' : \|\varphi\| \leq 1\}$.
7. Sea E un espacio de Banach de dimensión infinita, sea $S = \{x \in E : \|x\| < 1\}$. En (E, w) , S tiene interior vacío.
8. Sean E un espacio de Banach, $\varphi_n, \varphi \in E'$, tales que $\varphi_n \xrightarrow{w^*} \varphi$. Probar que $\|\varphi_n\|$ está acotada y que $\|\varphi\| \leq \liminf \|\varphi_n\|$.
9. Sean E un espacio de Banach, $x_n, x \in E$, $\varphi_n, \varphi \in E'$. Si $\varphi_n \xrightarrow{w^*} \varphi$ y $x_n \rightarrow x$ entonces $\varphi_n(x_n) \rightarrow \varphi(x)$.
10. Sean E un espacio de Banach, $\varphi_n, \varphi \in E'$.
 - (a) $\varphi_n \rightarrow \varphi \Rightarrow \varphi_n \xrightarrow{w} \varphi \Rightarrow \varphi_n \xrightarrow{w^*} \varphi$.
 - (b) Si $\dim E < \infty$, las tres convergencias son equivalentes.
11. Definamos $\varphi_n : E \rightarrow \mathbb{C}$ por $\varphi_n(x_1, x_2, \dots) = x_n$.
 - (a) Si $E = \ell^2$ probar que $\varphi_n \xrightarrow{w^*} 0$. ¿ $\varphi_n \rightarrow 0$?
 - (b) Si $E = \ell^\infty$ probar que $\varphi_n \in B_{E'}, \forall n \in \mathbb{N}$ pero que $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ no tiene ninguna subsucesión w^* -convergente. ¿Contradice esto el hecho de que $(B_{E'}, w^*)$ es compacta?

12. Sean $\varphi_n : C([-1, 1]) \rightarrow \mathbb{C}$ definidas por

$$\varphi_n(f) = f\left(\frac{-1}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right)$$

Probar que $\varphi_n \xrightarrow{w^*} 0$ pero $\varphi_n \not\xrightarrow{w} 0$.

13. Si $1 \leq p < \infty$, en ℓ^p , sea e^n dado por $(e^n)_k = \delta_k^n$. Probar que:

- (a) Si $1 < p < \infty$, $e^n \xrightarrow{w} 0$, $e^n \not\xrightarrow{w^*} 0$
(b) Si $p = 1$, $e^n \xrightarrow{w^*} 0$, $e^n \not\xrightarrow{w} 0$, $e^n \not\xrightarrow{w^*} 0$

14. Sean $1 < p < \infty$, $x^n, x \in \ell^p$. Entonces

$$x^n \xrightarrow{w} x \iff \sup \|x^n\|_p < \infty \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} x_k^n = x_k \quad \forall k$$

15. (a) Si $1 < p < \infty$, $\varphi_n, \varphi \in L^p[0, 1]$. Entonces

$$\varphi_n \xrightarrow{w} \varphi \iff \sup \|\varphi_n\|_p < \infty \wedge \int_0^a \varphi_n(t) dt \rightarrow \int_0^a \varphi(t) dt \quad \forall a \in [0, 1]$$

- (b) Si $\varphi_n(t) = \sin(n\pi t) \in L^2[0, 1]$, probar que $\varphi_n \xrightarrow{w} 0$ pero $\varphi_n \not\xrightarrow{w^*} 0$.

16. Sean $\varphi_n, \varphi \in L^\infty[0, 1]$, $M_{\varphi_n}, M_\varphi \in \mathcal{L}(L^2[0, 1])$ los operadores de multiplicación. Probar que

$$\varphi_n \xrightarrow{w^*} \varphi \iff M_{\varphi_n}(f) \xrightarrow{w} M_\varphi(f) \quad \forall f \in L^2[0, 1]$$

17. $C[0, 1]$ es cerrado en $L^\infty[0, 1]$ en $\|\cdot\|_\infty$ pero no en la topología w^* .

18. Sea, para cada $n \in \mathbb{N}$, $\varphi_n : c_0 \rightarrow \mathbb{C}$ definida por $\varphi_n(x) = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$

- (a) Probar que, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\varphi_n \in c'_0$ y calcular su norma.

- (b) Probar que $\varphi_n \xrightarrow{w^*} 0$ y que $\varphi_n \not\xrightarrow{w} 0$.

- (c) $c_0 \supset \circ\langle\{\varphi_1\}\rangle \supset \circ\langle\{\varphi_1, \varphi_2\}\rangle \supset \dots \supset \circ\langle\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}\rangle \supset \dots$, y son todos isométricamente isomorfos entre sí. ¿Ocurre lo mismo con $\circ\langle\{\varphi_i\}_{i=1}^\infty\rangle$?

19. (a) Si E es un espacio vectorial, $f_1, \dots, f_n, f : E \rightarrow \mathbb{C}$ son transformaciones lineales tales que $\cap_{i=1}^n \ker(f_i) \subset \ker(f)$, entonces $f \in \langle\{f_i\}_i\rangle$

- (b) Si E es un espacio de Banach, $f : E' \rightarrow \mathbb{C}$ es lineal y w^* -continua, entonces existen $c > 0$, $x_1, \dots, x_n \in E$ tales que

$$|f(\varphi)| \leq c \max_{1 \leq i \leq n} |\varphi(x_i)| \quad \forall \varphi \in E'$$

- (c) Si E es un espacio de Banach, $f : E' \rightarrow \mathbb{C}$ es lineal y w^* -continua, entonces existe $x \in E$ tal que $f(\varphi) = \varphi(x) \quad \forall \varphi \in E'$

20. Sean E un espacio de Banach, $J : E \rightarrow E''$ la inclusión canónica.

- (a) $J(B_E)$ es fuertemente cerrado, donde B_E es la bola unidad cerrada de E .

- (b) Dar un ejemplo en el que J no sea suryectiva.

21. Sean E y F espacios de Banach, $A_n \in \mathcal{L}(E, F)$. Si para cada $x \in E$ y para cada $\varphi \in F'$ la sucesión $\{\varphi(A_n x)\}$ está acotada, entonces $\{\|A_n\|\}$ está acotada.
22. Sean E un espacio de Banach reflexivo, $\varphi \in E'$.
- (a) (i) Probar que $\exists x \in E, x \neq 0 / \varphi(x) = \|\varphi\| \|x\|$
 - (b) (ii) Si M es un subespacio cerrado propio de E' , $\exists x \in {}^\circ M, \|x\| = 1 / \varphi(x) = d(\varphi, M)$
23. Si E es un espacio de Banach separable y $\{\varphi_n\}$ es una sucesión acotada en E' entonces existe una subsucesión $\{\varphi_{n_k}\}_k$ w^* -convergente.
- (Sug: Si $\{x_k\}$ es denso en E , $\{\varphi_n(x_1)\}_n$ tiene subsucesión convergente $\{\varphi_{n_1}(x_1)\}_{n_1}$, también, $\{\varphi_{n_1}(x_2)\}_{n_1}$ tiene subsucesión convergente $\{\varphi_{n_2}(x_2)\}_{n_2}$, seguir inductivamente y ver que $\{\varphi_{n_n}\}_n$ es w^* -convergente)
24. Sea E un espacio de Banach reflexivo.
- (a) Si $\{x_n\}_n$ está acotada en E , entonces tiene una subsucesión w -convergente.
(Sug: tomar S el subespacio cerrado generado por $\{x_n\}_n$, ver que S' es separable, usar ejercicio anterior e inclusión canónica en el bidual)
 - (b) Si $\{\varphi_n\}_n$ está acotada en E' , entonces tiene una subsucesión w^* -convergente.
25. Si E es un espacio de Banach de dimensión infinita separable o reflexivo, existe $\{\varphi_n\} \in E', \|\varphi_n\| = 1$ tal que $\varphi_n \xrightarrow{w^*} 0$.