

---

# ANÁLISIS MATEMÁTICO I (BIÓLOGOS)

Primer cuatrimestre – 2006

## Práctica 6: Primitivas, integrales y áreas.

---

1. i) Determine en cada caso  $g(x)$ , sabiendo que

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) $g'(x) = 2$       | e) $g'(x) = x$   |
| b) $g'(x) = \sin x$  | f) $g'(x) = e^x$ |
| c) $g'(x) = \cos x$  | g) $g'(x) = x^2$ |
| d) $g'(x) = x + x^2$ | h) $g'(x) = x^n$ |

ii) ¿Es única la función hallada en cada caso?

- iii) En cada caso, determine precisamente  $g(x)$  sabiendo además que  $g(0) = 5$   
iv) En cada caso, determine precisamente  $g(x)$  sabiendo además que  $g(1) = -1$

2. Verifique en cada caso que la primitiva de  $f(x)$  es  $F(x) + C$

I) $f(x) = x^\alpha$	$F(x) = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$
II) $f(x) = \frac{1}{x}$	$F(x) = \ln  x $
III) $f(x) = e^x$	$F(x) = e^x$
IV) $f(x) = \sin x$	$F(x) = -\cos x$
V) $f(x) = \cos x$	$F(x) = \sin x$
VI) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$F(x) = \arcsin x$
VII) $f(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$F(x) = \arccos x$
VIII) $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$	$F(x) = \arctan x$
IX) $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$	$F(x) = \tan x$
X) $f(x) = \frac{1}{\sin^2 x}$	$F(x) = -\cot x$

3. Calcule las siguientes primitivas

- I)  $\int x^2 dx$
- II)  $\int \sqrt{x} dx$
- III)  $\int (x^2 + \frac{1}{x})^2 dx$
- IV)  $\int (\frac{1}{x} + 2x - e^x) dx$
- V)  $\int x^{100} dx$
- VI)  $\int x^{\frac{-1}{2}} (3x + \sqrt{x}) dx$
- VII)  $\int (3x - \cos x + 2\sin x) dx$
- VIII)  $\int \frac{1}{\cos^2 x \sin^2 x} dx$

4. Aplicando el método de sustitución calcule estas primitivas

- I)  $\int x(x^2 + 1)^{-1} dx$
- II)  $\int \cos(x + 5) dx$
- III)  $\int x^{-1} \ln x dx$
- IV)  $\int (t + 1)(t^2 + 2t + 3)^{\frac{2}{3}} dt$
- V)  $\int \sin(7x) dx$
- VI)  $\int e^{3x} dx$
- VII)  $\int (5 - 2x)^{-1} dx$
- VIII)  $\int x(1 + 3x^2)^{-1} dx$
- IX)  $\int (x^2 + 2x + 5)^{-1} dx$
- X)  $\int (x + 1)^{-1} dx$
- XI)  $\int \cos x \sin^{-2} x dx$
- XII)  $\int x^{-1} \cos(\ln x) dx$
- XIII)  $\int (1 + y^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} dy$
- XIV)  $\int 5 \cos(5x) dx$
- XV)  $\int x e^{x^2} dx$
- XVI)  $\int (x + 1)^{-1} \ln(x + 1) dx$
- XVII)  $\int \cos^{-2}(2x) dx$
- XVIII)  $\int x(16 + x^4)^{-1} dx$

5. Calcule las siguientes primitivas integrando “por partes”

- I)  $\int (x + 2)^4 x dx$
- II)  $\int x^2 \cos x dx$
- III)  $\int x^2 (x + 4)^{\frac{-1}{2}} dx$
- IV)  $\int x^3 \cos x dx$
- V)  $\int e^{2x} \sin(3x) dx$
- VI)  $\int x^2 - 2e^{-x} dx$
- VII)  $\int x \sin x dx$
- VIII)  $\int \ln x dx$
- IX)  $\int (t^2 + t)(t + 1)^{-5} dt$
- X)  $\int e^x \cos x dx$
- XI)  $\int x \ln x dx$

6. Mediante la descomposición de funciones racionales en fracciones simples, calcule las primitivas de cada una de las siguientes funciones racionales

I)  $f(x) = 4(x-2)^{-1}(x-1)^{-1}$   
 II)  $f(x) = \frac{2x+2}{x^2-4}$   
 III)  $f(x) = \frac{x^3-2x}{x^2-1}$   
 IV)  $f(x) = \frac{8x^3+7}{8(x+1)(x+\frac{1}{2})^2}$

V)  $f(x) = \frac{3x-2}{(x+2)(x+3)}$   
 VI)  $f(x) = \frac{x}{(x+1)(x-2)(x+3)}$   
 VII)  $f(x) = (x^2-1)^{-2}$   
 VIII)  $f(x) = \frac{7x-6}{3x^3+6x^2+3x}$

7. Calcule las siguientes primitivas:

I)  $\int (x+2) \sin(x^2 + 4x - 6) dx$   
 II)  $\int \frac{3x^2}{\sqrt{5x^3+1}} dx$   
 III)  $\int x^{\frac{1}{2}} \ln x dx$   
 IV)  $\int x \ln(x^2 + 1) dx$   
 V)  $\int \frac{\ln^3 x}{x} dx$   
 VI)  $\int \frac{3x^2}{\sqrt{5x^3+1}} dx$   
 VII)  $\int e^{\sin x} \cos x dx$   
 VIII)  $\int x \arcsin x dx$   
 IX)  $\int (1 + \cos 2x)^{-2} \sin x dx$   
 X)  $\int \frac{(\sin x - 2)\cos x}{\sin^2 x + \sin x - 2} dx$   
 XI)  $\int \frac{xe^{3x^2}}{4 + e^{3x^2}} dx$   
 XII)  $\int \operatorname{tg} x \ln(\cos x) dx$   
 XIII)  $\int x(\sin x + \frac{x}{2}\cos x) \sqrt{x^2 \sin x} dx$   
 XIV)  $\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2+(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}} dx$   
 XV)  $\int x^5 \sqrt[5]{5-x^2} dx$   
 XVI)  $\int \sin^5(\frac{x}{6}) \cos(\frac{x}{6}) dx$   
 XVII)  $\int \frac{x - \sqrt{\operatorname{arc tg} 2x}}{1+4x^2} dx$

xviii)  $\int \frac{\sin x}{1+2\cos x} dx$   
 xix)  $\int \ln(x^2 + 1) dx$   
 xx)  $\int \frac{e^x + 3e^{2x}}{1-e^{2x}} dx$   
 xxI)  $\int 2x + \frac{2}{x} dx$   
 xxII)  $\int e^{\sqrt{x}} dx$   
 xxIII)  $\int \frac{\ln x + 1}{x(\ln^2 x - 3\ln x)} dx$   
 xxIV)  $\int e^x (e^{2x} + e^x + 1)^{-1} dx$   
 xxV)  $\int (x^2 + x)(x+1)^{-5} dx$   
 xxVI)  $\int \ln(1+x^2)^{\frac{1}{2}} dx$   
 xxVII)  $\int (x^3 + x) \cos(x^2 + 1) dx$   
 xxVIII)  $\int \frac{1}{\sqrt{(1+x^2) \ln[x+(1+x^2)]}} dx$   
 xxIX)  $\int \sqrt{e^x + 1} dx$   
 xxX)  $\int \operatorname{tg}^3 x dx$   
 xxXI)  $\int x \ln(x^2 + 1) dx$   
 xxXII)  $\int \operatorname{cosec}^4 x \operatorname{cotg}^{\frac{3}{2}} x dx$   
 xxXIII)  $\int \frac{\cos^3 x}{1+\cos^2 x} dx$

8. i) Determine  $g(x)$  tal que  $g'(x) = 2x^3$  y además  $g(0) = 3$ .  
ii) Determine  $h(x)$  tal que  $h'(x) = 2x^2 + e^x$  y además  $g(1) = e$ .  
iii) Determine una primitiva  $F(t)$  de  $f(t) = t \sen 5t$  con la condición  $F(\frac{\pi}{2})$ .

9. Aplicando la Regla de Barrow, determine

i) $\int_0^x \cos t dt$	iii) $\int_{\frac{\pi}{2}}^x \sen x dt$	v) $\int_a^b e^t dt$
ii) $\int_1^x t^r dt$ (para $x > 1$ )	iv) $\int_a^b \frac{1}{t} dt$	

10. Aplicando los métodos de sustitución y "por partes" calcule las integrales definidas

i) $\int_{-1}^{\sqrt{2}} x(x^2 + 1)^{-3} dx$	v) $\int_1^4 x^{-1} \cos(\ln x) dx$
ii) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \cos 2x)^{-2} dx$	vi) $\int_0^1 e^x (4 + 3e^x) dx$
iii) $\int_3^7 x \ln x dx$	vii) $\int_3^9 x \sqrt{x+1} dx$
iv) $\int_0^2 (1 + x^2)(x - 1)^{\frac{2}{3}} dx$	viii) $\int_0^1 e^x (e^{2x} + e^x + 1) dx$


11. Calcule la derivada de cada una de las funciones que definimos a continuación

i) $f_1(x) = \int_1^x e^{-t^2} dt$	v) $f_5(x) = \int_0^x \frac{\sen t}{1+t} dt$
ii) $f_2(x) = \int_0^x \sqrt{1+t^2} dt$	vi) $f_6(x) = \int_0^{\sen x} \frac{t}{2+t^2} dt$
iii) $f_3(x) = \int_0^{x^2} \frac{\cos t}{1+t^2} dt$	
iv) $f_4(x) = \int_2^{\operatorname{tg} x} \operatorname{arc tg} t dt$ con $x \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$	vii) $f_7(x) = \int_x^{x^3} \cos t^2 dt$

12. Determine los máximos y mínimos locales de la función  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por la siguiente expresión:

$$g(x) = \int_0^x e^{t^2} t^2 (t-1)(t-4) dt$$

13. Sea  $f : [0; 6] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua, y sea  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ . Si el gráfico de  $F(x)$  es el que aparece a continuación



- i) Calcule  $\int_0^6 f(t) dt$
- ii) Verifique que  $f(3) = 0$
- iii) Verifique que  $f(x) \geq 0$  en  $[0;3]$ , y  $f(x) < 0$  en  $(3;6]$ .
- iv) Demuestre que  $\int_0^6 |f(t)| dt = 2 \int_0^3 f(t) dt = 6$ .
14. Calcule el área de la región limitada por:
- La parábola  $y = \frac{1}{2}x^2$ , el eje X y las rectas  $x = 1, x = 2$ .
  - La recta  $y = -x + 5$ , el eje X y las rectas  $x = 6, x = 9$ .
15. En cada caso, determine el área de la región encerrada por la curva, el eje X y las rectas verticales indicadas.
- $y = x^3$ ,  $x = 2$ ,  $x = 5$ .
  - $y = x^2 - x + 1$ ,  $x = 0$ ,  $x = 1$ .
  - $y = x + \frac{1}{x}$ ,  $x = 1$ ,  $x = 2$ .
16. Determine  $a \in \mathbb{R}, a > 0$  tal que el área de la región encerrada entre el eje horizontal, el gráfico de  $f(x) = \operatorname{sen} x$  y las rectas verticales  $x = 0$  y  $x = a$  valga  $5/2$ .
17. Calcule el área de la región acotada limitada por las curvas dadas en cada caso
- $3y^2 - 3y = x - 1$ ,  $y^2 - 2y = x - 3$
  - $y = 3x^2 - x - 3$ ,  $y = -2x^2 + 4x + 7$
  - $y^2 = x$ ,  $x - y = 2$
  - $y = x^{1/3}$ ,  $x = 0$ ,  $y = 1$

- v)  $y = e^x$ ,  $y = e^{-x}$ ,  $x = 1$ ,  $x = -1$
- vi)  $y = x^{1/2}$ ,  $y = x - 2$ ,  $x = 0$
- vii)  $y = x^2 + 1$ ,  $y = -x$
- viii)  $y = x^3 - x$ ,  $y = x$
- ix)  $y = x^3 - x$  y la recta tangente a dicha curva en  $x = 1$ .
18. Sean  $p(t)$  y  $v(t)$  la posición y la velocidad instantánea de una partícula de trayectoria rectilínea, cuya aceleración instantánea es  $a(t) = 4t - 16$  y tal que la posición inicial era  $p(0) = 0$ , y la velocidad inicial  $v(0) = 30 \text{ cm/s}$ .
- Determinar  $v(t)$  y verificar que la velocidad es nula para  $t = 3$ .
  - Obtener la expresión de  $p(t)$  y calcular la posición para  $t = 3$ .
19. Un móvil se desplaza por un camino recto y su aceleración en el instante  $t$  vale  $a(t) = t(t - 100) \text{ km/h}^2$ . En el instante inicial el móvil estaba en la posición  $s_0$ , y su velocidad inicial era  $25 \text{ km/h}$ . ¿Cuál es la posición  $s(t)$  para  $0 < t < 100$ ?
20. Una nave espacial está en reposo en el Instante  $t = 0$ . Mediante mediciones de inercia en el interior de la nave se comprueba que recibe una aceleración instantánea  $a(t) = t^{1/2} + 1$  cuando  $t > 0$ , donde el tiempo se mide en segundos y la aceleración en  $\text{m/s}^2$ .
- ¿Qué velocidad lleva la nave cuando pasaron  $64 \text{ s}$  desde el arranque?
  - ¿A qué distancia del punto de partida está en ese instante?
21. Sabemos que  $x - 2$  es un factor de  $f(x) = 2x^3 - 7x^2 + x + a$ :
- Determine  $a$  y factorice  $f(x)$  totalmente.
  - Haga un gráfico aproximado de  $f(x)$ .
  - Calcule  $\int_{-1}^2 f(x) dx$ ;  $\int_2^{2.5} f(x) dx$ ;  $\int_{-1}^{2.5} f(x) dx$ .
22. Sea  $y = f(x)$  una curva tal que  $f'(x) = -x + a$  ( $a$  constante) tiene un punto crítico en  $(2;3)$ . Encuentre la función  $f(x)$  que describe la curva.
23. El corredor  $H_1$ , que es especialista en los 100 metros llanos desarrolla una velocidad instantánea  $v_1(t) = 10(1 - e^{3t})$  donde la distancia se mide en metros y el tiempo en segundos. Un segundo corredor  $H_2$  tiene una velocidad instantánea  $v_2(t) = \frac{21}{2}(1 - e^{-t})$ :
- ¿Qué distancia recorre cada corredor en los primeros 10s de carrera?
  - La misma pregunta en los primeros 20s.

iii) ¿Cuál de los corredores ganaría una carrera de 100m ?

iv) La misma pregunta, pero para una carrera de 200m .

(Sugerencia: En todos los casos suponer que el espacio inicial es 0.)