

PRÁCTICA 0: CONJUNTOS Y REPASO DE LA INTEGRAL DE RIEMANN

Ejercicio 1. Sean $(X_i)_{i \in I}$ y $(Y_j)_{j \in J}$ dos familias de conjuntos. Probar que

$$(a) \left(\bigcap_{i \in I} X_i \right) \cup \left(\bigcap_{j \in J} Y_j \right) = \bigcap_{(i,j) \in I \times J} (X_i \cup Y_j)$$

$$(b) \left(\bigcup_{i \in I} X_i \right) \cap \left(\bigcup_{j \in J} Y_j \right) = \bigcup_{(i,j) \in I \times J} (X_i \cap Y_j)$$

$$(c) \left(\bigcap_{i \in I} X_i \right) \times \left(\bigcap_{j \in J} Y_j \right) = \bigcap_{(i,j) \in I \times J} (X_i \times Y_j)$$

$$(d) \left(\bigcup_{i \in I} X_i \right) \times \left(\bigcup_{j \in J} Y_j \right) = \bigcup_{(i,j) \in I \times J} (X_i \times Y_j)$$

(e) Si $I = J$ y $\forall i \in I$ se tiene $Y_i \subseteq X_i$, entonces

$$\left(\bigcup_{i \in I} Y_i \right) \subseteq \left(\bigcup_{i \in I} X_i \right) \text{ y } \left(\bigcap_{i \in I} Y_i \right) \subseteq \left(\bigcap_{i \in I} X_i \right)$$

(f) Si $A \subseteq I$ entonces

$$\left(\bigcup_{i \in A} X_i \right) \subseteq \left(\bigcup_{i \in I} X_i \right) \text{ y } \left(\bigcap_{i \in I} X_i \right) \subseteq \left(\bigcap_{i \in A} X_i \right)$$

(g) Para cada conjunto F se tiene:

$$F - \bigcup_{i \in I} X_i = \bigcap_{i \in I} (F - X_i) \text{ y } F - \bigcap_{i \in I} X_i = \bigcup_{i \in I} (F - X_i)$$

Ejercicio 2.

(a) Sean $A_{n,k}$, $n, k \in \mathbb{N}$, conjuntos. Probar que

$$\bigcup_{k \in \mathbb{N}} \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_{n,k} \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_{n,k}$$

(b) Encontrar conjuntos $A_{n,k}$, $n, k \in \mathbb{N}$, tales que

$$\bigcup_{k \in \mathbb{N}} \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_{n,k} \neq \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_{n,k}$$

Ejercicio 3. Sean $(J_l)_{l \in L}$ y $(X_i)_{i \in I}$ dos familias de conjuntos tales que $\bigcup_{l \in L} J_l = I$. Probar que

$$(a) \bigcup_{i \in I} X_i = \bigcup_{l \in L} \left(\bigcup_{i \in J_l} X_i \right)$$

$$(b) \bigcap_{i \in I} X_i = \bigcap_{l \in L} \left(\bigcap_{i \in J_l} X_i \right)$$

Ejercicio 4. Si $A \times B = (A_1 \times B_1) \cup (A_2 \times B_2)$ con $(A_1 \times B_1) \cap (A_2 \times B_2) = \emptyset$, $A_1 \times B_1 \neq \emptyset$ y $A_2 \times B_2 \neq \emptyset$ entonces

$$(A = A_1 = A_2 \text{ y } B = B_1 \cup B_2) \text{ ó } (A = A_1 \cup A_2 \text{ y } B_1 = B_2 = B).$$

Ejercicio 5. Sean $f : E \rightarrow F$, $A \subseteq E$, $B \subseteq E$, $C \subseteq F$, $D \subseteq F$. Probar que

$$(a) A \subseteq B \Rightarrow f(A) \subseteq f(B)$$

$$(b) f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$$

$$(c) f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$$

$$(d) \text{ Si } f \text{ es inyectiva, entonces } f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

$$(e) A \subseteq f^{-1}(f(A)) \text{ y } f(f^{-1}(D)) \subseteq D$$

$$(f) \text{ Si } f \text{ es inyectiva, entonces } f(E - A) \subseteq F - f(A)$$

$$(g) \text{ Si } f \text{ es suryectiva, entonces } f(E - A) \supseteq F - f(A)$$

$$(h) f^{-1}(F - D) = E - f^{-1}(D)$$

Ejercicio 6. Sea $f : E \rightarrow F$ una función. Sean $(X_i)_{i \in I}$ y $(Y_j)_{j \in J}$ dos familias de subconjuntos de E y F respectivamente. Probar que

$$(a) f\left(\bigcup_{i \in I} X_i\right) = \bigcup_{i \in I} f(X_i)$$

$$(b) f\left(\bigcap_{i \in I} X_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in I} f(X_i)$$

$$(c) \text{ Si } f \text{ es inyectiva, entonces } f\left(\bigcap_{i \in I} X_i\right) = \bigcap_{i \in I} f(X_i)$$

$$(d) f^{-1}\left(\bigcap_{j \in J} Y_j\right) = \bigcap_{j \in J} f^{-1}(Y_j)$$

$$(e) f^{-1}\left(\bigcup_{j \in J} Y_j\right) = \bigcup_{j \in J} f^{-1}(Y_j)$$

Ejercicio 7. Dada una sucesión $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de subconjuntos de E , se define:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} E_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{k \geq n} E_k \quad (\text{l\u00edmite inferior})$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{k \geq n} E_k \quad (\text{l\u00edmite superior})$$

Probar que

(a) $E - \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} (E - E_n)$

(b) $E - \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} (E - E_n)$

(c) $\liminf_{n \rightarrow \infty} E_n \subseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n$

Si $\liminf_{n \rightarrow \infty} E_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n$, entonces se dice que existe el l\u00edmite de la sucesi\u00f3n $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y a este conjunto se lo denota por $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$. Probar que

(d) Si $E_{n+1} \subseteq E_n \ \forall n \in \mathbb{N}$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n$

(e) Si $E_n \subseteq E_{n+1} \ \forall n \in \mathbb{N}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$

(f) Dada una sucesi\u00f3n $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de subconjuntos de un conjunto E se define

$$\begin{cases} D_0 = \emptyset \\ D_{n+1} = D_n \triangle E_n \ \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Probar que existe $\lim_{n \rightarrow \infty} D_n$ si y s\u00f3lo si $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = \emptyset$.

Ejercicio 8. Sea X un conjunto. Para cada subconjunto $A \subseteq X$ se define $\chi_A : X \rightarrow \{0, 1\}$ por

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases}$$

(a) $A \subseteq B \Leftrightarrow \chi_A(x) \leq \chi_B(x) \ \forall x \in X$

(b) $\chi_{A \cap B}(x) = \chi_A(x) \cdot \chi_B(x) \ \forall x \in X$

(c) $\chi_{A \cup B}(x) = \chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_{A \cap B}(x) \ \forall x \in X$

Ejercicio 9. Sea $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesi\u00f3n de subconjuntos de X y $f : X \rightarrow Y$ una funci\u00f3n. Probar que

(a) $f(\liminf_{n \rightarrow \infty} E_n) \subseteq \liminf_{n \rightarrow \infty} f(E_n)$

(b) $f(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n) \subseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} f(E_n)$

$$(c) f(\liminf_{n \rightarrow \infty} E_n) \subseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} f(E_n)$$

(d) Si f es inyectiva, en (a) y (b) vale la igualdad.

Ejercicio 10. Sea E un conjunto y $f : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$ tal que $A \subseteq B \Rightarrow f(A) \subseteq f(B)$. Sean $R = \{Z \subseteq E : f(Z) \subseteq Z\}$ y $S = \{Z \subseteq E : f(Z) \supseteq Z\}$. Sean también

$$V = \bigcap_{Z \in R} Z \quad \text{y} \quad W = \bigcup_{Z \in S} Z$$

Probar que

$$(a) f(V) = V \quad \text{y} \quad f(W) = W.$$

(b) Si $A \subseteq E$ es tal que $f(A) = A$, entonces $V \subseteq A \subseteq W$.

Ejercicio 11. Repaso de la integral de Riemann Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada. Para cada partición $\pi : a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$ de $[a, b]$ consideramos las sumas inferior y superior de Riemann, definidas respectivamente por:

$$s_\pi(f) = \sum_{i=0}^{n-1} m_i(x_{i+1} - x_i) \quad S_\pi(f) = \sum_{i=0}^{n-1} M_i(x_{i+1} - x_i)$$

donde

$$m_i = \inf_{x \in [x_i, x_{i+1}]} f(x) \quad M_i = \sup_{x \in [x_i, x_{i+1}]} f(x)$$

Consideramos los números:

$$I = \sup\{s_\pi(f) : \pi \text{ partición de } [a, b]\} \quad (\text{integral inferior})$$

$$S = \inf\{S_\pi(f) : \pi \text{ partición de } [a, b]\} \quad (\text{integral superior})$$

Finalmente, decimos que f es integrable Riemann en $[a, b]$ si $I = S$, y en ese caso definimos

$$\int_a^b f(x) dx \quad (\text{según Riemann}) = I = S$$

Probar las siguientes afirmaciones:

- i) Una función es integrable Riemann en $[a, b]$ si y sólo si para cada $\varepsilon > 0$ es posible encontrar una partición π de $[a, b]$ tal que $S(\pi, f) - s(\pi, f) = \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i(x_{i+1} - x_i) < \varepsilon$, siendo $\omega_i = M_i - m_i$ la oscilación de f en el intervalo $[x_i, x_{i+1}]$.
- ii) Toda función monótona es integrable Riemann.
- iii) Toda función continua en $[a, b]$ es integrable Riemann.
- iv) $\chi_{\mathbb{Q}}$ (función de Dirichlet) no es integrable Riemann.

- v) Si $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una sucesión de funciones integrables Riemann en $[a, b]$ y $f_n(x) \rightarrow f(x)$ uniformemente para $x \in [a, b]$, entonces f es integrable Riemann en $[a, b]$, y se verifica que:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) dx (R) = \int_a^b f(x) dx (R)$$

- vi) Dar un ejemplo de una sucesión de funciones $f_n(x)$ integrables Riemann en $[a, b]$ tales que f_n esté uniformemente acotada en $[a, b]$ y converja puntualmente en $[a, b]$ a una función f que no sea integrable Riemann en $[a, b]$.