## PRÁCTICA 7: CONEXIÓN

## Conexión

Ejercicio 1. Decidir cuáles de los siguientes subconjuntos son conexos:

$$\{x\in\mathbb{R}^2\;/\;0<|x|<2\} \qquad,\qquad \mathbb{N}\qquad,\qquad [0,1)\qquad,\qquad \mathbb{Q}$$
 
$$\{\tfrac{1}{n}\;/\;n\in\mathbb{N}\} \qquad,\qquad B(a,\varepsilon) \text{ en un espacio métrico } (X,d).$$

**Ejercicio 2.** Dar ejemplos de conjuntos conexos  $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$  tales que  $A \cap B$  no sea conexo. Idem para  $A \setminus B$ .

**Ejercicio 3.** Sean X un espacio métrico y  $C \subseteq X$ .

- (a) Probar que si C es conexo y x es un punto de acumulación de C, entonces  $C \cup \{x\}$  es conexo.
- (b) Determinar la validez de las siguientes afirmaciones:
  - I. Si C es conexo, entonces  $C^{\circ}$  es conexo.
  - II. Si C es conexo, entonces  $\overline{C}$  es conexo.

**Ejercicio 4.** Sea (X,d) un espacio métrico y sea  $C \subseteq X$ . Probar que son equivalentes:

- (a) C es conexo.
- (b) No existen  $\mathcal{U}, \mathcal{V}$  abiertos en X y disjuntos, de modo que  $C \cap \mathcal{U} \neq \emptyset, C \cap \mathcal{V} \neq \emptyset$  y  $C \subseteq \mathcal{U} \cup \mathcal{V}$ .
- (c) Si  $A \subseteq C$  es no vacío y abierto y cerrado en C, entonces A = C.
- (d) Toda función  $f: C \to \{0,1\}$  continua es constante.

**Ejercicio 5.** Sea (X,d) un espacio métrico y sea  $\mathcal{A}$  una familia de conjuntos conexos de X tal que para cada par de conjuntos  $A, B \in \mathcal{A}$  existen  $A_0, \ldots, A_n \in \mathcal{A}$  que satisfacen  $A_0 = A$ ,  $A_n = B$  y  $A_i \cap A_{i+1} \neq \emptyset$  para cada  $i = 0, \ldots, n-1$ . Probar que  $\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A$  es conexo.

**Ejercicio 6.** Sea  $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{Z}$  continua. Probar que f es constante.

**Ejercicio 7.** Probar que si  $n \geq 2$  no existe un homeomorfismo entre  $\mathbb{R}$  y  $\mathbb{R}^n$ .

## Ejercicio 8.

- (a) Probar que si  $f:[0,1] \longrightarrow [0,1]$  es continua, existe  $x_0 \in [0,1]$  tal que  $f(x_0) = x_0$ .
- (b) Sea (X,d) un espacio métrico conexo y sea  $f:X\longrightarrow\mathbb{R}$  una función continua. Sean  $a,b\in f(X)$  tales que  $a\leq b$ . Probar que para todo  $c\in [a,b]$  existe  $x\in X$  tal que f(x)=c. ¿Vale la recíproca?
- (c) Probar que si (X, d) es conexo, entonces #X = 1 o  $\#X \ge c$ .

**Ejercicio 9.** Hallar las componentes conexas de los siguientes subconjuntos de  $\mathbb{R}$  y de  $\mathbb{R}^2$ 

(a) 
$$\arcsin(\left[\frac{\sqrt{2}}{2},1\right])$$

(c) 
$$B((-1,0),1) \cup B((1,0),1)$$

(d) 
$$B((-1,0),1) \cup B((1,0),1) \cup \{(0,0)\}$$

**Ejercicio 10.** Para cada  $n \in \mathbb{N}$ , sea  $A_n = \{\frac{1}{n}\} \times [0,1]$ , y sea  $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \cup \{(0,0),(0,1)\}$ . Probar que:

- (a)  $\{(0,0)\}$  y  $\{(0,1)\}$  son componentes conexas de X
- (b) Si  $B \subseteq X$  es abierto y cerrado en X, entonces  $\{(0,0),(0,1)\}\subseteq B$  ó  $\{(0,0),(0,1)\}\cap B=\emptyset$ .

**Ejercicio 11.** Sea (X, d) un espacio métrico. Probar que las componentes conexas de X son conjuntos cerrados.

## Arco Conexión

**Ejercicio 12.** Sea (X,d) un espacio métrico. Un conjunto  $A \subseteq X$  se dice arcoconexo (o conexo por arcos) si para todo par de puntos  $a,b \in A$  existe una función continua  $f:[0,1] \to X$  tal que f(0) = a y f(1) = b.

- (a) Probar que todo conjunto arcoconexo es conexo.
- (b) Exhibir un ejemplo de un conjunto conexo que no sea arcoconexo.

Ejercicio 13. Decidir cuáles de los siguientes conjuntos son arcoconexos:

- (a)  $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid z=f(x,y)\}$ , donde  $f:\mathbb{R}^2\longrightarrow\mathbb{R}$  es una función continua.
- (b)  $B(0,1) \subseteq \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus B(0,1)$
- (c)  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x,0) \mid x \in \mathbb{R}\}$
- (d)  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$

**Ejercicio 14.** Sean (X,d) un espacio métrico arcoconexo, (Y,d') un espacio métrico y  $f:X\to Y$  una función continua. Probar que el conjunto f(X) es arcoconexo.

**Ejercicio 15.** En el espacio  $(C[0,1],d_{\infty})$  se considera el conjunto

$$U = \{ f \in C[0,1] : f(x) \neq 0 \ \forall \ x \in [0,1] \}.$$

Probar que U es abierto y hallar sus componentes conexas.