

ELEMENTOS DE CÁLCULO NUMÉRICO

Práctica N°6: Polinomios ortogonales y aproximación de cuadrados mínimos

1. (a) Encontrar el polinomio de grado 1 que aproxima en el sentido de cuadrados mínimos la siguiente tabla de datos:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y	-1.1	1.1	1.9	3.2	3.8	5	6	7.3	8.1	8.9

y el polinomio de grado 2 que aproxima en el mismo sentido la siguiente tabla de datos:

x	-1	0	1	3	6
y	6.1	2.8	2.2	6	26.9

- (b) En cada caso, comparar gráficamente, usando Matlab, con el polinomio interpolador.

2. Considerar la función $f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}$ en el intervalo $[-1,1]$.

Para $n = 5, 10, 15$; graficar simultáneamente f junto con

- los polinomios que aproximan a f en el sentido de cuadrados mínimos en $n + 1$ puntos equiespaciados y tienen grado $\frac{2}{5}n$ y $\frac{4}{5}n$,
- el polinomio que resulta de interpolar a f en los puntos anteriores.

3. Probar que si se tienen $n + 1$ puntos distintos, el polinomio de cuadrados mínimos de grado n coincide con el polinomio interpolador.

Concluir que para ciertas aplicaciones puede ser una mala idea aumentar el grado del polinomio de cuadrados mínimos, hasta hacerlo cercano al grado del polinomio interpolador.

4. Sea A la matriz en $\mathbb{R}^{3 \times 2}$ dada por $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{pmatrix}$. Mostrar que

(a) $\det(A^T A) = (ad - bc)^2 + (af - be)^2 + (cf - ed)^2$.

(b) Los rangos de las matrices $A^T A$ y A coinciden.

(c) El polinomio de grado 1 que aproxima en el sentido de cuadrados mínimos una tabla de 3 datos es único.

5. Aproximar la siguiente tabla de datos en el sentido de cuadrados mínimos

x	-1	0	2	3
y	0.3	-0.2	7.3	23.3

con funciones del tipo: (a) $y = a2^x + b3^x$, (b) $y = a2^x + b3^x + c$.

6. Considerar $\operatorname{erf} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función dada por

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

- (a) Graficar la función con el comando `erf` de Matlab en el intervalo $[-5, 5]$ y verificar numéricamente que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \operatorname{erf}(x) = \pm 1$.
- (b) Ajustar la función erf en el sentido de cuadrados mínimos con polinomios de grado 1, 2, 5 y 10; considerando 15 puntos equiespaciados en el intervalo $[-1, 1]$. Graficar erf junto con estos polinomios en el intervalo $[-5, 5]$. Observar que la aproximación es mala fuera del intervalo $[-1, 1]$.
- (c) Utilizando los mismos puntos, hallar la aproximación de cuadrados mínimos que utiliza el siguiente modelo:

$$\operatorname{erf}(t) \sim c_1 + c_2 e^{-t^2} + c_3 \frac{e^{-t^2}}{1+t} + c_4 \frac{e^{-t^2}}{(1+t)^2} + c_5 \frac{e^{-t^2}}{(1+t)^3}.$$

Comparar el error obtenido al aproximar por la función hallada con el del ítem anterior.

7. Aproximar los datos de la tabla siguiente

x	-1	0	1	2
y	8.1	3	1.1	0.5

con un modelo de la forma: $f(x) \sim a e^{bx}$; en el sentido de cuadrados mínimos para la función $\ln(f(x))$.

8. Aproximar los datos de la tabla siguiente

x	-1	0	1	2
y	-1.1	-0.4	-0.9	-2.7

con un modelo de la forma: $f(x) \sim -e^{ax^2+bx+c}$, en el sentido de cuadrados mínimos para la función $\ln(f(x))$.

9. Decidir cuáles de las siguientes aplicaciones $\langle \cdot, \cdot \rangle: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, son productos internos, siendo $X = \{\text{polinomios de grado menor o igual a 1 definidos en } [0, 1]\}$.

(a) $\langle f, g \rangle = f(0) + 2g(0)$

(b) $\langle f, g \rangle = (f(0) + g(0))^2$

(c) $\langle f, g \rangle = f(0)g(0) + \int_0^1 f'(t)g'(t)dt$

(d) $\langle f, g \rangle = f(0)g(0) + f(1)g(1)$

10. Sea $\langle f, g \rangle$ cualquiera de los siguientes productos escalares:

(a) $\langle f, g \rangle = \sum_0^n f(x_j)g(x_j)w_j$, (b) $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)w(x)dx$

Probar que $S = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ no puede ser un conjunto ortogonal para $n \geq 2$.

11. **Polinomios de Laguerre.** Utilizando el método de Gram-Schmidt, calcular los primeros cuatro polinomios mónicos ortogonales con respecto al producto escalar:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^\infty e^{-x} f(x)g(x)dx.$$

12. **Polinomios de Hermite.** Repetir el ejercicio anterior con el producto escalar

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} f(x)g(x)dx.$$

13. Considerar

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f'(x)g'(x) dx$$

(a) Probar que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto interno en S_m , el espacio generado por $\{x, x^2, x^3, \dots, x^m\}$.

(b) Hallar una base ortonormal para S_3 .

(c) Hallar la mejor aproximación en el sentido de cuadrados mínimos sobre S_3 para $f(x) = x^4$ y para $g(x) = 1$.

14. Sea S el subespacio de las funciones derivables definidas en el intervalo $[-\pi, \pi]$ generado por $\{1, \cos(x), \sin(x)\}$ y considerar

$$\langle f, g \rangle = f'(-\frac{\pi}{2})g'(-\frac{\pi}{2}) + f'(0)g'(0) + f(\frac{\pi}{2})g(\frac{\pi}{2}).$$

(a) Probar que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto interno en S .

(b) Hallar una base ortonormal para S .

(c) Hallar la mejor aproximación en el sentido de cuadrados mínimos sobre S para $f(x) = \sin(2x)$, $g(x) = \cos(2x)$ y $h(x) = \frac{3}{2} \sin(2x) - 5 \cos(2x)$.

15. Usando las fórmulas que se dan a continuación

$$\sin(kx) \sin(mx) = \frac{1}{2} [\cos((k-m)x) - \cos((k+m)x)],$$

$$\sin(kx) \cos(mx) = \frac{1}{2} [\sin((k+m)x) + \sin((k-m)x)],$$

$$\cos(kx) \cos(mx) = \frac{1}{2} [\cos((k+m)x) + \cos((k-m)x)].$$

(a) Probar que el conjunto de funciones: $\{1, \sin(kx), \cos(mx), k, m \in \mathbb{N}\}$ es ortogonal con el producto escalar

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(x)g(x)dx.$$

y calcular las normas de cada una de estas funciones.

(b) Verificar la ortogonalidad y calcular la norma de los polinomios de Tchebychev, con el producto escalar

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 \frac{f(x)g(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

(Sugerencia: usar el cambio de variables $u = \arcsin(x)$).

16. Hallar los primeros 5 términos de la expansión en serie de Tchebychev para la función $f(x) = |x|$. Graficar en el intervalo $[-1, 1]$.

17. Sea T_j el polinomio de Tchebychev de grado j ; ($j \in \mathbb{N}$). Considerar las relaciones de ortogonalidad discretas para éstos polinomios:

$$\sum_{k=1}^m T_i(x_k)T_j(x_k) = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ m/2 & i = j \neq 0 \\ m & i = j = 0 \end{cases}$$

donde $\{x_k; k = 1, \dots, m\}$ es el conjunto de ceros de T_m .

Para una función $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ se definen m coeficientes $c_j, j = 1, \dots, m$ según

$$c_j = \frac{2}{m} \sum_{k=1}^m f(x_k)T_{j-1}(x_k).$$

Probar que el polinomio $\left[\sum_{k=1}^m c_k T_{k-1}(x) \right] - 0.5c_1$ interpola a f en las raíces de T_m .

(Sugerencia: usar Ejercicio 3).

Notar que esta fórmula proporciona una manera más directa de encontrar el polinomio interpolador en los ceros de T_m .