

ELEMENTOS DE CÁLCULO NUMÉRICO
Primer Cuatrimestre 2006

Práctica N°7: Integración numérica

1. Usar las fórmulas cerradas de Newton-Cotes de dos y tres puntos (reglas de trapecios y de Simpson, respectivamente) para calcular las integrales:

$$\int_0^1 x^4 dx \qquad \int_{0.1}^{0.2} \ln(x) dx \qquad \int_0^3 \frac{1}{1+x} dx$$

Calcular, además, en forma exacta cada una de las integrales anteriores y verificar la cota del error.

2. Interpolando las funciones de base de Lagrange, hallar una fórmula de cuadratura por interpolación de la forma

$$\int_0^{2h} f(x) dx \sim A_0 f(0) + A_1 f(h).$$

3. Usar el método de coeficientes indeterminados para dar una fórmula de cuadratura por interpolación:

$$\int_0^{3h} f(x) dx \sim A_0 f(0) + A_1 f(h) + A_2 f(3h).$$

4. Construir la fórmula abierta de Newton-Cotes para calcular $\int_{-1}^1 f(x) dx$ con nodos $-1/2$, 0 , $1/2$, y la fórmula cerrada de Newton-Cotes con nodos en los puntos -1 , $-1/3$, $1/3$, 1 .
5. Considerar la función definida en $[-h, h]$ ($h > 0$):

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } -h \leq x \leq 0 \\ x, & \text{si } 0 < x \leq h. \end{cases}$$

Hallar el error de la regla de trapecios aplicada a $f(x)$. ¿El orden es igual al obtenido para una función suficientemente suave?

6. La fórmula de cuadratura

$$\int_a^b f(x) dx \sim f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)$$

es conocida como *Regla de los Rectángulos*. Para $f \in C^1[a, b]$ acotar el error que se comete al utilizarla.

7. Para f una función C^2 probar que el error cometido al usar la fórmula de cuadratura del Ejercicio 2 no excede el valor $\frac{\|f''\|_\infty}{2}h^3$.

8. (a) Hallar una fórmula de cuadratura del tipo:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \sim Af(-2) + Bf(0) + Cf(2).$$

- (b) Para $f \in C^3[-2, 2]$ probar que el error cometido no excede el valor $\frac{7}{12}\|f^{(3)}\|_\infty$.

9. Escribir un programa que utilice las reglas de trapecios, de Simpson, de trapecios compuesta y de Simpson compuesta para calcular aproximaciones de la integral de una función $f(x)$ en un intervalo $[a, b]$.

10. Se sabe que $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4}$.

- (a) Para $n = 1, \dots, 100$, utilizar las reglas de trapecios y Simpson compuestas para aproximar numéricamente la integral y dar un valor cercano a π .
 (b) Graficar las sucesiones obtenidas junto con el valor de π que arroja **Matlab** y el valor que se obtiene al aplicar la rutina **quad** de **Matlab**.

11. (a) Calcular exactamente la integral

$$I = \int_0^{2\pi} [1 - \cos(32x)] dx.$$

- (b) Aproximar el valor de I usando el programa del Ejercicio 9 con los métodos de los trapecios, Simpson, trapecios compuesta y Simpson compuesta para $n = 2, 4, 8$ y 16 .

- (c) Calcular el valor de I que produce la rutina **quad**.

12. Se quiere calcular $\int_{-1}^1 e^{-x^2} dx$ utilizando la regla de trapecios compuesta, partiendo el intervalo $[-1, 1]$ en n subintervalos. Hallar n de modo que el error sea menor que 10^{-3} .

13. La expresión $Q_n(f) = \sum_{j=0}^n A_j f(x_j)$ define una fórmula de cuadratura.

- (a) Probar que Q_n es lineal en f (el conjunto de funciones).
 (b) Supongamos que $Q_n(f) \sim \int_a^b f(x)w(x) dx$ y que es exacta para las funciones $1, x, \dots, x^k$. Mostrar que la fórmula tiene grado de precisión por lo menos k .

14. Determinar el grado de precisión de las fórmulas para $\int_{-1}^1 f(x) dx$:

- (a) $\frac{4}{3}f(-0.5) - \frac{2}{3}f(0) + \frac{4}{3}f(0.5)$.
 (b) $\frac{1}{4}f(-1) + \frac{3}{4}f(-\frac{1}{3}) + \frac{3}{4}f(\frac{1}{3}) + \frac{1}{4}f(1)$.

15. Hallar reglas de cuadratura de grado de precisión máximo para aproximar $\int_{-3}^3 f(x) dx$, de las siguientes formas:

- (a) $A[f(x_0) + f(x_1)]$ (repetiendo el coeficiente).

(b) $Af(x_0) + Bf(x_0 + 4)$.

y determinar cuáles son dichos grados.

16. Sea $w : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función estrictamente positiva. Demostrar que para todo conjunto de nodos $\{x_1, \dots, x_n\}$, coeficientes $A_1, \dots, A_n$, y para todo intervalo $[c, d]$; el grado de precisión de la forma de cuadratura

$$\sum_{i=1}^n A_i f(x_i) \sim \int_a^b f(x)w(x)dx$$

es el mismo que el de la forma

$$\sum_{i=1}^n B_i f(y_i) \sim \int_c^d f(x)\tilde{w}(x)dx$$

donde $l : [a, b] \rightarrow [c, d]$ es la función lineal que transforma al intervalo $[a, b]$ en el intervalo $[c, d]$, $B_i = \frac{d-c}{b-a}A_i$, $y_i = l(x_i)$ y $\hat{w} : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ está definida por $\hat{w}(x) = w(l^{-1}(x_i))$.

17. Calcular $\int_{-1}^1 f(x)x^2 dx$ mediante una regla de cuadratura de la forma

$$\int_{-1}^1 f(x)x^2 dx \sim A_0f(x_0) + A_1f(x_1)$$

que sea exacta para polinomios de grado menor o igual que 3.

18. (a) Hallar una regla de cuadratura del siguiente tipo

$$\int_{-1}^1 f(x)\sqrt{|x|}dx \sim A_0f(x_0) + A_1f(x_1).$$

que tenga grado de precisión máximo. ¿Cuál es dicho grado?

- (b) Hallar una regla de cuadratura del siguiente tipo

$$\int_0^4 f(x)\sqrt{\left|\frac{x-2}{2}\right|}dx \sim A_0f(x_0) + A_1f(x_1).$$

que tenga grado de precisión máximo. ¿Cuál es dicho grado? Sugerencia: Usar el ejercicio 16.

19. Sea w una función de peso. Se considera la regla de cuadratura de 1 punto:

$$\int_a^b f(x)w(x) dx \sim A_0f(s).$$

- (a) Probar que, cualquiera sea w , la fórmula tiene grado de precisión máximo si

$$s = \frac{\int_a^b xw(x) dx}{\int_a^b w(x) dx}.$$

- (b) Probar que si $w(x) \equiv 1$, esta regla coincide con la regla de los rectángulos.

- (c) Considerar el intervalo $[-1, 1]$ y $w(x) = (x - 1)^2$. Acotar el error que produce el uso de esta regla para funciones C^1 .

20. Hallar los pesos y los nodos de las fórmulas de Gauss-Legendre de dos y tres puntos. (Los polinomios de Legendre mónicos de grado dos y tres son $x^2 - \frac{1}{3}$ y $x^3 - \frac{3}{5}x$).
21. Usar las fórmulas de Gauss-Legendre de tres puntos para estimar:

$$(a) \int_{-1}^1 \sin(3x) \, dx, \quad (b) \int_1^3 \ln(x) \, dx, \quad (c) \int_1^2 e^{x^2} \, dx.$$

22. Probar que una fórmula de cuadratura

$$\int_a^b f(x)w(x) \, dx \sim Q_n(f) = \sum_{j=0}^n A_j f(x_j)$$

no puede tener grado de precisión mayor que $2n + 1$, independientemente de la elección de los coeficientes (A_j) y de los nodos (x_j) .

Sugerencia: Hallar un polinomio $p \in \mathbb{R}_{2n+2}[X]$ para el cual $Q_n(p) \neq \int_a^b p(x)w(x) \, dx$.

23. Para $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua, se quiere dar una fórmula de cuadratura que aproxime $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$ con $D \subset \mathbb{R}^2$ usando el Teorema de Fubini de la siguiente manera:

- (a) Si $D = [0, 1] \times [0, 1]$, se define la función $F(x) = \int_0^1 f(x, y) \, dy$ y luego
- Se aproximan los valores $F(0), F(\frac{1}{2}), F(1)$ con la regla de Simpson.
 - Se aproxima $\int_0^1 F(x) \, dx$ usando otra vez la misma regla.

Hallar explícitamente la regla que se obtiene. (Los nodos a considerar serán $\{(0, 0), (\frac{1}{2}, 0), (1, 0), (0, \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (1, \frac{1}{2}), (0, 1), (\frac{1}{2}, 1), (1, 1)\}$).

- (b) Repetir el procedimiento y dar la fórmula correspondiente para D el triángulo de vértices $(0, 0), (0, 1), (1, 0)$.

Sugerencia: considerar $F(x) = \int_0^x f(x, y) \, dy$.

- (c) Probar que si D es el triángulo de vértices $(0, 0), (0, 1), (1, 0)$ la fórmula anterior es exacta para $f(x, y) = x^2 + y^2$.