

ESTADÍSTICA (Químicos)
PRÁCTICA Nº 2

1. Se arroja una moneda 3 veces, y se observa la secuencia de caras y cecas.
 - a) Describa el espacio muestral.
 - b) Enumere los elementos de los siguientes eventos:
 - i) A = al menos dos caras.
 - ii) B = en los dos primeros tiros salieron caras.
 - iii) C = en el último tiro salió ceca.
 - iv) A^c
 - v) $A \cap B$
 - vi) $A \cup C$

2. Se arroja un dado seis veces. ¿Cuál de las siguientes opciones ofrece la mejor chance de ganar?. ¿O son equivalentes?.
 - a) Ganar 1\$ si sale al menos un as.
 - b) Ganar 1\$ si sale un as todas las veces.
 - c) Ganar 1\$ si sale la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 - d) Ganar 1\$ si los dos primeros números que salen son iguales.

3. Una caja contiene 3 bolitas rojas, 2 azules y 4 blancas. Se extraen simultáneamente 2 bolitas. Calcule la probabilidad de obtener:
 - a) una bolita azul o una roja.
 - b) una bolita azul y una roja.
 - c) al menos una bolita roja.
 - d) las dos bolitas del mismo color.

4. Se arroja un dado tres veces. Decir si es verdadero o falso: la probabilidad de obtener al menos un as es $1/6+1/6+1/6=1/2$.

5. La siguiente tabla muestra el resultado de un estudio para la comparación de tiempos de reacción de tres diferentes reactivos (A, B y C) realizado en 125 porciones del mismo tamaño provenientes de una misma muestra.

	Reacciona antes de los 10 minutos		Total
	SI	NO	
Reactivo A	35	15	50
Reactivo B	18	32	50
Reactivo C	20	5	25
Total	73	52	125

Si se elige al azar una porción de las 125 analizadas

- a) cuál es la probabilidad de que se haya usado el reactivo B y no haya reaccionado?
- b) cuál es la probabilidad de que haya reaccionado?
- c) si se sabe que se usó el reactivo A, cuál es la probabilidad de que haya reaccionado?
- d) si se sabe que reaccionó, cuál es la probabilidad de que haya sido utilizado el reactivo A?
- e) cuál es la probabilidad de que no haya sido utilizado el reactivo C y haya reaccionado?
- f) sabiendo que no fue usado el reactivo C, cuál es la probabilidad de que haya reaccionado?
- g) cuál es la probabilidad de que haya reaccionado o haya sido usado el reactivo A?

6. Para cada una de las siguientes cajas, decir si color y número son dependientes o independientes.

Caja 1. Contiene 2 tickets con el número 1 (uno rojo y otro blanco) y 4 tickets con el número 2 (dos rojos y dos blancos).

Caja 2. Contiene 3 tickets con el número 1 (dos rojos y uno blanco) y 3 tickets con el número 2 (dos rojos y uno blanco).

Caja 3. Contiene 1 ticket con el número 1 (blanco), 3 tickets con el número 2 (dos rojos y 1 blanco) y 2 tickets con el número 3 (uno rojo y uno blanco).

7. Se arroja un dado seis veces. La probabilidad de que no salga ni as ni dos puede ser encontrada por uno de los siguientes cálculos. ¿Cuál?. Justifique.

- a) $(2/6) (4/6)^5$
- b) $6! / (4! 2!) (2/6)^4 (4/6)^2$
- c) $(4/6)^6$

8. Si la probabilidad de tener un hijo varón es $1/2$. Qué proporción de las familias con 6 chicos tiene tres varones y tres mujeres?