

## A) Consistencia y distribución asintótica.

1. (a) Sea  $\delta_n$  un estimador con  $V_\theta(\delta_n) < \infty$ . Probar que si  $\text{ECM}_\theta(\delta_n) \rightarrow 0$ , entonces  $\delta_n$  es débilmente consistente.

(b) Sea  $X_1, \dots, X_n$  una m.a. tal que  $E_\theta(X) = \theta$  y  $V_\theta(X) < \infty$ . Consideremos el siguiente estimador aleatorizado de  $\theta$ :

$$\delta_n = (1 - \varepsilon_n) \bar{X} + \varepsilon_n n$$

donde  $\varepsilon_n \sim \text{Bi}(1, 1/n)$  y es independiente de las  $X_i$ . Probar que  $\delta_n$  es débilmente consistente, aunque  $\text{ECM}_\theta(\delta_n) \rightarrow \infty$ .

2. Sea  $\Theta$  un espacio paramétrico finito y  $\delta_n$  el EMV de  $\theta$ . Probar que  $\delta_n$  es débilmente consistente si y sólo si  $P_\theta(\delta_n = \theta) \rightarrow 1 \forall \theta \in \Theta$ .

3. Sea  $X_1, \dots, X_n$  una muestra aleatoria de una distribución  $\mathcal{E}(\theta)$ . Probar que el EMV de  $\theta$  es fuertemente consistente y asintóticamente eficiente.

4. Sea  $X_1, \dots, X_n$  una muestra aleatoria de una distribución  $\mathcal{P}(\lambda)$ . Consideremos  $\delta_n = \bar{X}$  y

$$\delta_n^* = -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2}$$

(a) Analizar si estos estimadores de  $\lambda$  son fuertemente consistentes.

(b) Hallar sus distribuciones asintóticas. Decir si alguno de los dos es asintóticamente eficiente. (NOTA:  $E(X^4) = \lambda^4 + 6\lambda^3 + 7\lambda^2 + \lambda$ )

5. Sea  $X_1, \dots, X_n$  una muestra aleatoria de una distribución  $U(0, \theta)$ .

(a) Probar que el EMV de  $\theta$  es débilmente y fuertemente consistente y hallar su distribución asintótica.

(b) Probar que el estimador de momentos para  $\theta$  es fuertemente consistente y hallar su distribución asintótica.

(c) ¿Cuál de estos dos estimadores preferiría? ¿Por qué?

6. Sea  $X_1, \dots, X_n$  una m.a. de una distribución exponencial desplazada, cuya densidad es

$$f(x) = e^{-(x-\theta)} I_{[\theta, \infty)}(x).$$

(a) Probar que el EMV de  $\theta$  es débilmente y fuertemente consistente y hallar su distribución asintótica.

(b) Probar que el estimador de momentos para  $\theta$  es consistente y hallar su distribución asintótica.

(c) ¿Cuál de estos dos estimadores preferiría? ¿Por qué?

7. Sea  $X_1, \dots, X_n$  una m.a. de una distribución  $F_0(x - \theta)$  con  $F_0$  una función de densidad fija y  $\theta \in \mathbb{R}$ . Sea  $\delta_n$  un estimador de  $\theta$  equivariante por traslaciones (i.e.: para cualquier constante  $c \in \mathbb{R}$  se verifica que  $\delta_n(x_1 + c, \dots, x_n + c) = \delta_n(x_1, \dots, x_n) + c$ ). Mostrar que la varianza asintótica de  $\delta_n$  (si existe) no depende de  $\theta$ .

8. Sea  $X_1, \dots, X_n$  una muestra aleatoria de una distribución  $F$  con densidad  $f(x - \mu)$  donde  $f(x)$  satisface: i)  $f(x) = f(-x)$ , ii)  $f(x)$  continua en  $x = 0$ .
- (a) Sea  $Z_{a,i} = I\{X_i \leq a\}$ . Mostrar que  $Z_{a,i}$  tiene distribución  $\text{Bi}(1, F(a))$ .
  - (b) Sea  $Z_a = \sum Z_{a,i}$ . Mostrar que  $Z_a$  tiene distribución  $\text{Bi}(n, F(a))$ .
  - (c) Probar que
$$P(Z_a \geq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1) \leq P(\text{mediana}(X_1, \dots, X_n) \leq a) \leq P(Z_a \geq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor)$$
  - (d) Mostrar que  $\text{mediana}(X_1, \dots, X_n)$  es un estimador débilmente consistente de  $\mu$ .

**B) Ejercicio para hacer en la computadora.**

1. Retomemos el ejercicio 1 de la práctica 2 parte D). Para cada uno de los 4 conjuntos de 1000 datos realizar un histograma. Puede decir algo sobre las distribuciones asintóticas de los estimadores?, a que familias pertenecen?, cuáles son sus parámetros?.