

# Lógica y Computabilidad

FCEyN - UBA

Segundo Cuatrimestre 2008

## Práctica 3: Consecuencia Lógica

**Notación** Si  $\Gamma$  es un conjunto de fórmulas, denotaremos por  $Con(\Gamma)$  al conjunto de fórmulas que son consecuencia lógica de  $\Gamma$ .

1. Decidir si los siguientes conjuntos de fórmulas son satisfactibles, y en tal caso encontrar todas las valuaciones que satisfacen a dichos conjuntos.

a)  $\Gamma = \{((p_1 \rightarrow p_2) \rightarrow p_3), \neg p_2, (p_1 \vee p_3)\}$ .

b)  $\Gamma = \{((p_2 \rightarrow p_1) \rightarrow p_1), \neg p_1, (p_1 \wedge p_3), (p_3 \rightarrow p_1)\}$ .

Comparar el método de las tablas de verdad y de los árboles.

2. Decidir si las siguientes fórmulas son tautologías, contradicciones o contingencias.

a)  $(\neg(p_1 \vee p_2) \rightarrow ((p_3 \wedge p_1) \vee (p_2 \rightarrow p_3)))$ .

b)  $\neg((p_1 \rightarrow p_3) \rightarrow ((p_2 \rightarrow p_3) \rightarrow ((p_1 \vee p_2) \rightarrow p_3)))$ .

c)  $((p_1 \vee p_2) \rightarrow (p_3 \rightarrow ((p_1 \wedge p_3) \vee (p_2 \wedge p_3))))$ .

d)  $((\neg\neg\neg(p_1 \wedge p_2) \vee p_3) \rightarrow p_4)$ .

e)  $((p_1 \rightarrow p_2) \rightarrow p_1) \rightarrow p_1$ .

Comparar el método de las tablas de verdad y de los árboles.

3. Sea  $\Gamma \subseteq Form$ .

a) Probar que si  $\Gamma$  es satisfactible y  $\Gamma' \subseteq \Gamma$ , entonces  $\Gamma'$  es satisfactible.

b) Mostrar (con un ejemplo) que la recíproca no es cierta.

- c) Probar que  $\Gamma$  es satisfactible si y sólo si  $Con(\Gamma)$  es satisfactible.
4. (\*)
- a) Sea  $\Gamma$  un conjunto satisfactible de fórmulas. Probar que si el conjunto de valuaciones que satisface a  $\Gamma$  es finito entonces  $\Gamma$  es infinito.
- b) Probar que si  $k$  es un número natural, entonces existe un conjunto satisfactible  $\Gamma$  de fórmulas del cálculo proposicional tal que existen exactamente  $k$  valuaciones que satisfacen a  $\Gamma$ .
5. Sea  $\Gamma$  un conjunto de fórmulas del cálculo proposicional tal que  $\Gamma = Con(\Gamma)$ . Probar que  $\Gamma$  es infinito.
6. Sean  $\Gamma, \Gamma_1, \Gamma_2$  conjuntos de fórmulas.
- a) Probar que  $Con(\emptyset) = \{\alpha \in Form / \alpha \text{ es una tautología}\}$ .
- b) Probar que  $\Gamma \subseteq Con(\Gamma)$ .
- c) Probar que  $Con(Con(\Gamma)) = Con(\Gamma)$ .
- d) Probar que  $Con(\Gamma_1) \cup Con(\Gamma_2) \subseteq Con(\Gamma_1 \cup \Gamma_2)$ .

Sin embargo ...

- e) Probar que no vale para todo  $\Gamma_1, \Gamma_2$  la propiedad  $Con(\Gamma_1) \cup Con(\Gamma_2) \supseteq Con(\Gamma_1 \cup \Gamma_2)$ .

Ver que de las propiedades anteriores se deduce:

- f) Probar que  $\Gamma_1 \subseteq \Gamma_2$ , entonces  $Con(\Gamma_1) \subseteq Con(\Gamma_2)$ .
- g) Probar que si  $\Gamma_1 \subseteq Con(\Gamma_2)$  entonces  $Con(\Gamma_1) \subseteq Con(\Gamma_2)$ .
7. Sean  $\alpha, \beta \in Form$ . Analizar la validez de las siguientes afirmaciones:
- a)  $Con(\{\beta\}) \subseteq Con(\{\alpha\})$  si y sólo si  $\alpha \rightarrow \beta$  es tautología.
- b)  $Con(\{(\alpha \wedge \beta)\}) = Con(\{\alpha\}) \cap Con(\{\beta\})$ .
- c)  $Con(\{(\alpha \vee \beta)\}) = Con(\{\alpha\}) \cup Con(\{\beta\})$ .
- d)  $Con(\{(\alpha \rightarrow \beta)\}) \subseteq Con(\{\beta\})$ .
8. Demostrar que son equivalentes:
- a)  $\neg(\alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_n) \in Con(\emptyset)$ .

- b)  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  no son simultáneamente válidas para ninguna valuación.
- c) Existe una fórmula  $\beta$  tal que  $\beta \in \text{Con}(\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\})$  y  $\neg\beta \in \text{Con}(\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\})$ .
- d)  $\beta \in \text{Con}(\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\})$  para toda fórmula  $\beta$ .

9. Sea  $\Gamma$  un conjunto satisfactible de fórmulas. Decimos que  $\Gamma$  es *maximalmente satisfactible* si para toda fórmula  $\alpha \notin \Gamma$  se tiene que  $\Gamma \cup \{\alpha\}$  es insatisfactible.

Dado un conjunto satisfactible de fórmulas  $\Gamma$ :

- a) Probar que  $\Gamma$  es maximalmente satisfactible si y sólo si existe una valuación  $v \in \text{Val}$  tal que  $\Gamma = \{\alpha \in \text{Form} / v(\alpha) = 1\}$ .
- b) Probar que  $\Gamma$  es maximalmente satisfactible si y sólo si para toda fórmula  $\alpha$  se tiene que  $\alpha \in \Gamma$  o  $\neg\alpha \in \Gamma$ .
- c) Probar que existe  $\Gamma' \subseteq \text{Form}$  maximalmente satisfactible tal que  $\Gamma \subseteq \Gamma'$ .
- d) Si  $\Gamma$  maximalmente satisfactible, probar que si  $(\alpha \vee \beta) \in \Gamma$ , entonces  $\alpha \in \Gamma$  o  $\beta \in \Gamma$ .
- e) Si  $\Gamma$  es maximalmente satisfactible, probar que  $\Gamma \models \alpha$  si y sólo si  $\alpha \in \Gamma$ .

10. Dado un conjunto satisfactible de fórmulas  $\Gamma$ :

- a) Si  $\Gamma$  es un conjunto maximalmente satisfactible, ¿es necesariamente  $\Gamma = \text{Con}(\Gamma)$ ?
- b) Si  $\Gamma = \text{Con}(\Gamma)$ , ¿es necesariamente  $\Gamma$  un conjunto maximalmente satisfactible?

11. (\*) Decimos que dos conjuntos  $\Gamma, \Gamma' \subset \text{Form}$  son *equivalentes* si para toda fórmula  $\alpha$  se tiene que  $\Gamma \models \alpha$  si y sólo si  $\Gamma' \models \alpha$ .

Decimos que un conjunto  $\Gamma$  es *independiente* si ninguna fórmula de  $\Gamma$  está tautológicamente implicado por las restantes fórmulas de  $\Gamma$ .

- a) Probar que todo conjunto finito de fórmulas tiene un subconjunto independiente equivalente.
- b) Probar que un conjunto infinito de fórmulas no siempre tiene un subconjunto independiente equivalente.
- c) Si  $\Gamma$  es infinito, mostrar que existe un conjunto independiente equivalente  $\Gamma'$  (aunque en general  $\Gamma'$  no es un subconjunto de  $\Gamma$ ).