

Práctica 6

1. Sea $f(z) = \frac{1}{z(z-1)(z-2)}$; hallar el desarrollo en serie de Laurent de f en cada uno de los siguientes anillos:
 - a) $0 < |z| < 1$
 - b) $1 < |z| < 2$
 - c) $|z| > 2$
 - d) $1 < |z-2| < 2$

2. Hallar el desarrollo en serie de Laurent de las siguientes funciones en las regiones indicadas
 - a) $\frac{2}{z^3 - 3z^2 + 2z}$ en $1 < |z| < 2$
 - b) $\frac{1}{z(z-1)^2}$ en $0 < |z-1| < 1$ y en $|z-1| > 1$
 - c) $\frac{z^2 - 1}{(z+2)(z+3)^2}$ en $0 < |z+3| < 1$ y en $2 < |z| < 3$.

3. a) Decidir dónde convergen las series de Laurent de las siguientes funciones alrededor de z_0 :
 - i) $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ ($z_0 = 0$)
 - ii) $f(z) = e^z + \frac{z^2 + 1}{z^2 - 2z + 1}$ ($z_0 = 1$)
 b) ¿Cuánto vale el coeficiente de z en el desarrollo en serie de Laurent de $f(z) = \frac{e^z}{z-1}$ en la región $|z| > 1$?

4. Si f tiene una singularidad no evitable en $z = i$ y en $z = 2i$, probar que el desarrollo en serie de Laurent de f en la corona $1 < |z| < 2$ tiene infinitos términos positivos e infinitos términos negativos no nulos.

5. Probar que en todo disco perforado $0 < |z| < \epsilon$ la función $e^{\frac{1}{z}}$ toma todos los valores complejos salvo el cero.

6. Sea $f(z) = e^{-\frac{1}{z^2}}$, $z \neq 0$. Mostrar que f tiene una singularidad esencial en $z = 0$ y explicar por qué este hecho muestra que $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $F(0) = 0$ y $F(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$, $x \neq 0$, si bien es indefinidamente derivable en \mathbb{R} , no coincide con su serie de Taylor en ningún entorno de cero.

7. Cada una de las siguientes funciones tiene una singularidad aislada en $z = 0$. Determinar su naturaleza. Si es evitable, definir $f(0)$ de modo que resulte holomorfa en $z = 0$. Si es un polo, hallar la parte singular.

$$\begin{array}{lll} \text{a)} f(z) = \frac{z^2 + 1}{z(z - 1)} & \text{b)} f(z) = \frac{\operatorname{sen} z}{z} & \text{c)} f(z) = \frac{\cos z - 1}{z} \\ \text{d)} f(z) = e^{\frac{1}{z}} & \text{e)} f(z) = \frac{\log(z + 1)}{z} & \text{f)} f(z) = \frac{1}{z} \cos\left(\frac{1}{z}\right) \\ \text{g)} f(z) = \frac{1}{1 - e^z} & \text{h)} \operatorname{sen} z \operatorname{sen}\left(\frac{1}{z}\right) & \end{array}$$

8. Hallar y clasificar las singularidades de las siguientes funciones:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} f(z) = \frac{1 + z^2}{z(z - 1)^2} & \text{b)} f(z) = \frac{1}{z^3} \operatorname{sen} z & \text{c)} f(z) = \frac{1 - \cos z}{z^2} \\ \text{d)} f(z) = e^{2z}(z - 1)^2 & \text{e)} f(z) = \frac{\cos z}{z + 1} & \text{f)} f(z) = e^{\frac{1}{z^2}} \\ \text{g)} f(z) = \cos\left(\frac{\pi}{z - \pi}\right) & \text{h)} -\frac{1}{\operatorname{sen}\left(\frac{1}{z^2 + 1}\right)} & \text{i)} \frac{e^{\frac{1}{z}}}{(z + 1)z} \end{array}$$

9. a) Mostrar que $f(z) = \operatorname{tg} z$ es meromorfa en \mathbb{C} .
 b) Hallar sus polos y el orden de los mismos.
 c) Determinar la parte singular de f en cada polo.
10. Sea $f(z) = \frac{a_m z^m + \dots + a_1 z + a_0}{b_n z^n + \dots + b_1 z + b_0}$. Probar
 a) ∞ es a lo sumo una singularidad aislada.
 b) si $m \leq n$, f es holomorfa en ∞ . ¿Cuánto vale f en el punto en el infinito?
 c) si $m > n$, ∞ es un polo. Hallar su orden.

11. Clasificar las singularidades de las siguientes funciones en \mathbb{C}_∞ :

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \frac{e^z - 1 - z}{z^2} & \text{b)} \frac{\cos z - 1}{z^6 + z^4} \\ \text{c)} \frac{\cos z - 1}{(z - 2\pi)^2} + \frac{z - 3}{(z + 1)^2(z - 2)} & \text{d)} e^{\frac{z}{1-z}} \\ \text{e)} \frac{e^{z^2 + \frac{1}{z^2}} - 1}{z^2 - 1} & \end{array}$$

12. a) Hallar una función f no holomorfa en 0 y tal que $\operatorname{Res}(f, 0) = 0$.
 b) Mostrar que una función puede ser holomorfa en ∞ y tener residuo no nulo allí.

- c) Probar que si f tiene una singularidad esencial en $z = a$, $\frac{1}{f}$ tiene una singularidad esencial, o no aislada, en $z = a$.
- d) Mostrar que si ∞ es un cero de f de orden mayor que 1, entonces $\text{Res}(f, \infty) = 0$.
- e) Mostrar que si ∞ es un cero simple de f , entonces: $\text{Res}(f, \infty) = -\lim_{z \rightarrow \infty} z f(z)$.
13. Probar:
- a) Sea a un polo de orden m de f y sea $g(z) = (z-a)^m f(z)$, entonces: $\text{Res}(f, a) = \frac{1}{(m-1)!} g^{(m-1)}(a)$
- b) Si a es un polo simple de f , entonces: $\text{Res}(f, a) = \lim_{z \rightarrow a} (z-a)f(z)$
14. Sea f una función meromorfa en un abierto conexo G . Probar:
- a) Si f tiene un polo de orden m en $a \in G$, su derivada logarítmica tiene en él un polo simple, siendo $\text{Res}(f'/f, a) = -m$.
- b) Si f tiene un cero de orden m en $b \in G$, su derivada logarítmica tiene en él un polo simple, siendo $\text{Res}(f'/f, b) = m$.
- c) Si f tiene un polo simple en a y g es holomorfa en a entonces $\text{Res}(fg, a) = \text{Res}(f, a) \cdot g(a)$.
15. Calcular los residuos de las funciones del ejercicio 8, en cada una de sus singularidades aisladas.
16. a) Clasificar en \mathbb{C}_∞ las singularidades de:
- i) $\frac{\text{sen}(\frac{z}{z+3})}{(z+2 - \frac{i}{4\pi})(1 - e^{1/(z+2)})}$ ii) $e^{az}(1 + e^z)^{-1}$
- b) Calcular el residuo en infinito de:
- i) $\frac{z^3}{(z-1)(z-2)(z-3)}$ ii) $\frac{e^{\frac{1}{z}}}{(z+1)z}$
17. Hallar los residuos en \mathbb{C}_∞ de las funciones del ejercicio 11, en cada una de sus singularidades aisladas.
18. Sea \mathcal{C} la circunferencia $|z| = 2$, recorrida una vez en sentido positivo. Calcular:
- a) $\int_{\mathcal{C}} \frac{z}{z^4 + 1} dz$
- b) $\int_{\mathcal{C}} \frac{dz}{(z+1)^4(z^2-9)(z-4)}$
- c) $\int_{\gamma} \frac{dz}{\text{sen } z^2}$ $\gamma : |z| = \frac{\pi}{2}$ en sentido negativo.

19. Sea $G = \mathbb{C} - [-1, 1]$. Se define en G la función $f(z) = z^2 \log\left(\frac{z+1}{z-1}\right)$.

a) Calcular $\text{Res}(f, \infty)$.

b) Utilizando el método de los residuos, calcular:

$$\int_C f(z) dz \quad \text{siendo } C : |z| = 2$$

20. Sea f una función holomorfa en $\mathbb{C}_\infty - \{-1, 2\}$ tal que -1 es un polo simple y 2 un polo doble. Se sabe además que:

$$\text{- Res}(f, -1) = 1 \quad \text{y} \quad \text{Res}(f, 2) = 2$$

$$\text{- } f(0) = \frac{7}{4} \quad \text{y} \quad f(1) = \frac{5}{2}$$

Determinar f y calcular su desarrollo en serie de Laurent en potencias de z en la corona $1 < |z| < 2$ y el residuo de f en ∞ .