

**ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS - PRACTICA 2**  
**Primer Cuatrimestre 2004**

(1) Probar que las siguientes definiciones son equivalentes (cualquiera de las dos se puede tomar como la definición de función localmente Lipschitz en la variable  $x$  en  $J \times D$ ),

(a) Para todo intervalo abierto  $I \subset\subset J$  y  $B$  bola abierta con  $\bar{B} \subset D$  existe  $L > 0$  tal que para todo  $t \in I$ ,  $x_1, x_2 \in B$

$$|f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq L|x_1 - x_2|.$$

(b) Para todo  $I \subset\subset J$  y  $\Omega \subset\subset D$  existe  $L > 0$  tal que para todo  $t \in I$ ,  $x_1, x_2 \in \Omega$ ,

$$|f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq L|x_1 - x_2|.$$

Obs: En (b),  $I$  no tiene por qué ser un intervalo y  $\Omega$  no tiene por qué ser una bola.

(2) En las siguientes ecuaciones,

(a)  $\dot{x} = \frac{x}{t}$ ,  $x(1) = 3$ .

(b)  $\dot{x} = \frac{x}{2t}$ ,  $x(9) = 2$ .

(c)  $\dot{x} = \frac{x}{t} + \frac{t}{x}$ ,  $x(2) = 4$ .

(d)  $xy^2dy = (x^3 + y^3)dx$ ,  $y(1) = 1$ .

(e)  $\log(y^2 + 1) + \frac{2y(x-1)}{y^2 + 1}y' = 0$ ,  $y(2) = 0$ .

(f)  $t + x^2 - 2tx\dot{x} = 0$ ,  $x(1) = 2$ .

(g)  $(y + xy^2)dx - xdy = 0$ ,  $y(1) = 2$ .

(h)  $y' - \frac{n}{x}y = e^x x^n$ ,  $y(1) = e + 3$ .

(i)  $y' + \frac{1-2x}{x^2}y - 1 = 0$ ,  $y(1) = 1 + 2e$ .

(j)  $\dot{x} = \lambda x^2$ , con  $\lambda \in \mathbb{R}$   $x(t_0) = x_0$ .

- (i) Justificar la existencia y unicidad de la solución.
- (ii) Encontrar la solución.
- (iii) Hallar el intervalos maximal de definición de la solución  $(a, b)$ .

(iv) Analizar si existe

$$(1) \lim_{t \rightarrow a^+} x(t) = x_1$$

$$(2) \lim_{t \rightarrow b^-} x(t) = x_2.$$

(v) Estudiar si  $f(x, t)$  tiene singularidad en  $(x_1, a)$  o en  $(x_2, b)$  si  $\dot{x} = f(x, t)$  ( $x_1$  y/o  $x_2$  podrían ser  $\infty$ ).

(3) (a) La función nula es solución de

$$y' = y^{1/3} \quad y(0) = 0$$

en la semirecta  $x < 0$ . Definir dos prolongaciones distintas a toda la recta real que sean solución del sistema.

(b) ¿Contradice (a) el teorema de unicidad de solución?

(c) Encontrar otra ecuación de primer orden cuya solución no sea única.

(4) (a) Probar que el problema

$$\begin{cases} \dot{x} = 1 + x^2 \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

tiene solución en el intervalo maximal  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ .

(b) Hallar el intervalo maximal de existencia de

$$\begin{cases} \dot{x} = x^p \\ x(0) = x_0 > 0. \end{cases}$$

(c) Probar que el intervalo maximal de existencia de

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x) \\ x(t_0) = x_0. \end{cases}$$

es finito si y sólo si  $\int_{x_0}^{\infty} \frac{1}{f(s)} ds < \infty$ .

(5) Sean  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  continuas y  $f$  Lipschitz. Probar que el sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x), & x(0) = x_0 \\ \dot{y} = g(x)y, & y(0) = y_0 \end{cases}$$

tiene solución única en cualquier intervalo donde este definida.

¿Se puede quitar la hipótesis de que  $f$  sea Lipschitz ?

(6) Sea  $f \in C^1(J \times D \times \Lambda)$  con  $D \subset E$ ,  $\Lambda \subset B$  y  $E, B$  espacios vectoriales de dimensión finita. Sea  $u(t, \tau, \xi, \lambda)$  la solución maximal de

$$\dot{x} = f(t, x, \lambda) \quad , \quad x(\tau) = \xi.$$

Encontrar los problemas de valores iniciales que satisfacen  $\frac{\partial u}{\partial \tau}$  y  $\frac{\partial u}{\partial \lambda_i}$ .

(7) Probar que las siguientes formulas definen flujos globales en  $E$  y hacer un bosquejo del correspondiente diagrama de fases,

(a)  $E = \mathbb{R}^2$   $\varphi(t, (x, y)) = (e^t x, e^t y)$

(b)  $E = \mathbb{C}$   $\varphi(t, z) = e^{(i-1)t} z$

(c)  $E = \mathbb{R}^2$   $\varphi(t, (x, y)) = (x, tx + y)$

(d)  $E = \mathbb{R}^2$   $\varphi(t, (x, y)) = (e^{-t} x, e^{-t}(tx + y))$

- (8) Determinar el flujo inducido por el campo  $x \mapsto x^2$  sobre  $E = \mathbb{R}$ . ¿Cuál es el dominio  $\Omega$  del flujo y  $J(x)$  para  $x \in \mathbb{R}$ ? Si  $\Omega_t := \{x \in E / (t, x) \in \Omega\}$ , determinar  $\Omega_t$  para  $t \in \mathbb{R}$ . Si  $\varphi_t : \Omega_t \rightarrow E$ ,  $\varphi_t(x) := \varphi(t, x)$ , describir el comportamiento de las transformaciones  $\varphi_t$  y  $\varphi_{-t}$ .
- (9) Sea  $\varphi : \mathbb{R} \times D \rightarrow D$  un flujo con  $D \subset \mathbb{R}^n$  abierto. Probar que, para todo  $t \in \mathbb{R}$ ,  $\varphi_t : D \rightarrow D$  es un homeomorfismo.
- (10) Sea  $\varphi : \mathbb{R} \times D \rightarrow D$  un flujo. Sea  $p_0 \in D$  cualquiera. La función  $\varphi(\cdot, p_0) : \mathbb{R} \rightarrow D$  es una curva continua que se llama órbita o trayectoria de  $p_0$ . A veces también se llama órbita o trayectoria de  $p_0$  al conjunto imagen de esa función que denotaremos

$$\mathcal{O}(p_0) = \{\varphi(t, p_0) / t \in \mathbb{R}\}.$$

Probar que dos órbitas distintas no se cortan.

- (11) Sea  $\varphi$  un flujo en  $\mathbb{R}^n$ . Probar que,
- (a) El conjunto de los puntos críticos es cerrado.
- (b) Si  $\varphi(t, y) \rightarrow x$  cuando  $t \rightarrow t^+(y)$  o  $t \rightarrow t^-(y)$ . Entonces  $x$  es un punto crítico.