

PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA (C)

PRÁCTICA 8

1. Encontrar un intervalo de confianza de nivel exacto $1 - \alpha$ para la media de una población normal
 - a) con varianza conocida.
 - b) con varianza desconocida.
2. Se realiza a 10 pacientes un análisis de sangre con el fin de determinar el porcentaje de hemoglobina, obteniéndose $\bar{X} = 12\%$ y $s = 0.5\%$.
 - a) Hallar un intervalo de confianza para la media verdadera, de nivel exacto 0.90, suponiendo que la concentración de hemoglobina se distribuye normalmente.
 - b) Idem (a), suponiendo además que $\sigma = 0.6\%$.
 - c) Si se quisiera que la longitud del intervalo hallado en (b) fuera a lo sumo 0.5, ¿a cuántos pacientes debería analizarse?
3. Encontrar un intervalo de confianza de nivel exacto $1 - \alpha$ para la varianza de una población normal
 - a) con media conocida.
 - b) con media desconocida.
4. En un aserradero se cortan varillas de madera cuya longitud es una v.a. con distribución normal. Se miden 25 varillas elegidas al azar, obteniéndose $\bar{X} = 180$ cm y $s = 10$ cm.
 - a) Hallar un intervalo de confianza de nivel exacto 0.90 para la varianza verdadera, suponiendo que $\mu = 185$.
 - b) Idem (a), suponiendo μ desconocida.
5. Sea X_1, \dots, X_n una muestra aleatoria de una población $\mathcal{E}(\lambda)$.
 - a) Probar que $2\lambda \sum_{i=1}^n X_i$ tiene distribución χ_{2n}^2 .
 - b) Hallar un intervalo de confianza para λ de nivel exacto $1 - \alpha$.
 - c) ¿Cuál sería el intervalo de confianza de nivel exacto $1 - \alpha$ para $E(X_1)$? ¿Cuál sería su longitud esperada?
 - d) Aplicar (b) a los datos del Ejercicio 5.(a) de la Práctica 7, con un nivel del 95%.
 - e) Hallar un intervalo de nivel asintótico $1 - \alpha$ para λ .

6. Una muestra aleatoria de 1000 votantes es encuestada respecto a cierta propuesta política. Como resultado, 200 están de acuerdo con la propuesta, 600 se oponen y 200 están indecisos.
- Hallar un intervalo de confianza de nivel asintótico 0.90 para la proporción de votantes que se oponen a la propuesta.
 - ¿Cuántos votantes deberían encuestarse para que la longitud del intervalo obtenido fuese menor o igual que 0.02?
7. Sea X_1, \dots, X_n una muestra aleatoria de una población $Bi(k, \theta)$.
- Hallar un intervalo de confianza de nivel asintótico $1 - \alpha$ para θ , siendo k conocido.
 - Encontrar una cota superior para la longitud del intervalo hallado en el inciso anterior.
8. Sea X_1, \dots, X_n una muestra aleatoria de una población $\mathcal{P}(\lambda)$.
- Hallar un intervalo de confianza de nivel asintótico $1 - \alpha$ para λ .
 - Aplicar (a) a los datos del Ejercicio 5.(b) de la Práctica 7, con $\alpha = 0.05$.
9. a) Sea X_1, \dots, X_n una muestra aleatoria de una distribución $\mathcal{U}[0, \theta]$. Hallar el intervalo de confianza de nivel exacto $1 - \alpha$ para θ , de menor longitud.
(SUGERENCIA: Encontrar la distribución de $\max_{1 \leq i \leq n} (X_i) / \theta$.)
- b) Sea X_1, \dots, X_n una muestra aleatoria de una población con densidad

$$f(x; \theta) = e^{-(x-\theta)} I_{[\theta, \infty)}(x)$$

Hallar el intervalo de confianza de nivel exacto $1 - \alpha$ para θ , de menor longitud.

(SUGERENCIA: Encontrar la distribución de $\min_{1 \leq i \leq n} (X_i) - \theta$.)

10. Sean X_1, \dots, X_n v.a. continuas i.i.d. y con función de densidad dada por $f(x)$. Sea $\tilde{\mu}$ la mediana de la distribución de las X 's, es decir $P(X_i \leq \tilde{\mu}) = \frac{1}{2}$ para todo i .

- a) Probar que

$$P\left(\max_{1 \leq i \leq n} X_i < \tilde{\mu} \cup \min_{1 \leq i \leq n} X_i > \tilde{\mu}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}.$$

- b) Deducir que $\left(\min_{1 \leq i \leq n} X_i, \max_{1 \leq i \leq n} X_i\right)$ es un intervalo de confianza para $\tilde{\mu}$ de nivel $1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.