

## PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA (C)

### PRÁCTICA 2

1. Se eligen tres autos al azar y cada uno es clasificado  $N$  si tiene motor naftero o  $D$  si tiene motor diesel (por ejemplo, un resultado posible sería  $NND$ ).

- a) Definir un espacio muestral  $\mathcal{S}$  apropiado para este experimento.
- b) Consideremos la variable aleatoria

$X$ : “cantidad de autos diesel entre los tres elegidos”.

Enumerar cada  $s \in \mathcal{S}$  con su correspondiente  $X(s)$ .

- c) Suponiendo que  $\mathcal{S}$  es equiprobable, calcular la función de probabilidad puntual de  $X$ .
2. Si el espacio muestral  $\mathcal{S}$  es un conjunto infinito, ¿implica esto necesariamente que cualquier variable aleatoria  $X$  definida sobre  $\mathcal{S}$  tendrá un conjunto infinito de valores posibles? Si la respuesta es sí, aclare por qué; si es no, dé un ejemplo.
  3. Un paquete estadístico consiste en 12 programas, de los cuales 5 deben ser actualizados. Se eligen 4 paquetes al azar, llamemos  $X$  al número de programas que deben ser actualizados entre los cuatro.
    - a) Hallar la función de probabilidad puntual asociada a  $X$  y graficarla.
    - b) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 2 de los paquetes elegidos deban ser actualizados?
    - c) Hallar la función de distribución acumulada de  $X$
    - d) ¿Cuál es el número esperado de programas, entre los 4 elegidos, que deben ser actualizados?
  4. Sea  $X$  una variable aleatoria con función de distribución

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ .3 & \text{si } 1 \leq x < 3 \\ .4 & \text{si } 3 \leq x < 6 \\ .6 & \text{si } 6 \leq x < 12 \\ 1 & \text{si } 12 \leq x \end{cases}$$

- a) Hallar la función de probabilidad puntual de  $X$ .
- b) Usando solamente la función de distribución, calcular:

$$P(3 < X \leq 6) \quad P(3 \leq X \leq 6) \quad P(X \geq 4) \quad P(X \geq 6)$$

5. Se tienen dos urnas con 5 bolillas cada una. En la urna A hay dos bolillas blancas y tres negras; y en la urna B hay una bolilla blanca y cuatro negras. Se tira un dado equilibrado. Si el resultado es múltiplo de 3, se sacan dos bolillas sin reposición de la urna A; en caso contrario, las extracciones se hacen de la urna B. Sea  $X$  el número de bolillas blancas extraídas.

- a) Hallar las funciones de probabilidad puntual y de distribución asociadas a  $X$ .
- b) Calcular  $E(X)$  y  $V(X)$ .
6. Sea  $X$  una v.a. con distribución Bernoulli de parámetro  $p$ .
- a) Calcular  $E(X^k)$  para  $k \in \mathbb{N}$
- b) Mostrar que  $V(X) = p(1 - p)$ .
7. **El bit de paridad.** Supongamos que queremos enviar un caracter. El código ASCII le asigna a cada caracter un número de manera tal que sólo debemos preocuparnos por como enviar números. En el ejercicio 21 de la práctica 1 vimos cómo podemos representar los números utilizando bits. Para enviar números utilizamos 7 bits, es decir que el número 5 lo representamos como 0000101. Para disminuir la probabilidad de errores se le agrega a este conjunto de 7 bits un nuevo bit denominado bit de paridad. Este nuevo bit toma el valor 0 ó 1 de forma tal de que el conjunto de 8 bits tenga una cantidad par de unos. Si queremos enviar el número 5, como su representación tiene una cantidad par de unos el bit de paridad vale 0 y por lo tanto se envía 00001010. El número 93 se lo representa como 1011101 ( $1(2^6) + 0(2^5) + 1(2^4) + 1(2^3) + 1(2^2) + 0(2^1) + 1(2^0)$ ). Como tiene una cantidad impar de unos, el bit de paridad vale 1 y se envía 10111011. De esta forma, siempre que se recibe un conjunto de 8 bits se sabe que los primeros 7 contienen la información y que el total de unos recibidos debe ser par. Si la cantidad de unos recibidos es impar significa que hubo un error en la transmisión. Supongamos que las transmisiones de los diferentes bits actúan en forma independiente y que la probabilidad de que un bit sea enviado incorrectamente es  $p$ . Consideremos el experimento de enviar un caracter y llamemos  $X =$  cantidad de bits con error.
- (a) Si no se usa el bit de paridad (solo se envían 7 bits), ¿qué distribución tiene  $X$ ? ¿cuál es la probabilidad de que el caracter sea enviado en forma errónea?
- (b) Si se usa el bit de paridad, ¿cuál es la probabilidad de que el caracter sea enviado en forma errónea (sin importar si esto es detectado o no)?
- (c) ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un error y no sea detectado? Comparar esta probabilidad con la del ítem (a) para  $p = 0.01$ .
- (d) Graficar (en un mismo gráfico) las probabilidades obtenidas en (a) y en (c) en función de  $p$  (utilizando una computadora).
8. El 70% de las consultas de un sistema interactivo de computación requiere de acceso a bases de datos. Un sistema recibe 25 consultas independientes unas de otras,
- a) ¿cuál es la probabilidad de que:
- exactamente 20 consultas requieran acceso a una base de datos?
  - el número de consultas que requieran acceso a una base de datos esté entre 20 y 24 inclusive?
- b) Calcular el valor esperado y la varianza del número de consultas que requieren acceso a una base de datos.

9. Un comerciante sabe que hay una probabilidad  $p = 0.20$  de que en un día cualquiera le sea pedido un televisor de una marca determinada. Supongamos, además, que en un día le es solicitado a lo sumo un televisor de esa marca, y que la demanda de un día es independiente de la de cualquier otro día.
- Hallar la probabilidad de que no le soliciten ningún televisor de esa marca en un período de 15 días de actividad.
  - En el mismo período, ¿cuál es la probabilidad de que la demanda sea de a lo sumo 3 televisores?
  - Si al comienzo de ese período tiene 6 televisores de esa marca, ¿cuál es la probabilidad de que no pueda satisfacer la demanda?
10. Se tienen dos dados, uno equilibrado y el otro cargado en el cual los números 1 y 2 tienen probabilidad  $1/3$  y el resto  $1/12$ . Se elige un dado al azar y se lo arroja tres veces (independientemente). Sea  $X$  el número de veces que sale 1 ó 2.
- ¿Cuál es la distribución de  $X$  condicional a que se eligió el dado cargado?
  - Hallar una expresión general para  $p_X(k)$ .
11. Un instructor de tenis tiene 12 tubos de pelotas de tenis de marca Lincoln y 15 tubos de marca Wilson. Hay 10 parejas de estudiantes en la clase y a cada una se le entrega un tubo de pelotas elegido al azar entre todos los tubos disponibles.
- ¿Cuál es la probabilidad de que 5 tubos de cada marca sean utilizados en la clase?
  - ¿Cuál es la probabilidad de que se usen entre 4 y 6 tubos marca Lincoln?
12. Para verificar si se cumplen las normas establecidas para arrojar residuos al río Reconquista, un inspector visita al azar 10 de las 50 industrias establecidas a orillas de dicho río.
- Si en realidad 35 industrias no cumplen con alguna de las normas, ¿cuál es la distribución del número de industrias visitadas que están en infracción? Calcular la probabilidad de que 6 de las industrias visitadas estén en infracción.
  - Si hay 500 industrias de las cuales 350 están en infracción, aproximar la distribución de (a) por una más simple. Calcular nuevamente la probabilidad de que 6 de las industrias visitadas estén en infracción.
  - Sea  $X$  el número de fábricas que están en infracción entre las 10 visitadas. Calcular  $E(X)$  y  $V(X)$  para las distribuciones exacta (a) y aproximada (b).
13. Una rueda de ruleta está dividida en 38 secciones, de las cuales 18 son rojas, 18 son negras y las 2 restantes son verdes. Sea  $X$  el número necesario de juegos para obtener una sección verde en jugadas independientes.
- ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 4 jugadas sean necesarias?
  - Si fueron necesarias 7 o más jugadas, ¿cuál es la probabilidad de que se necesiten al menos 10 jugadas? Comparar con (a).

- c) ¿Cuál es la probabilidad de que sea necesario un número impar de jugadas?
- d) Hallar  $E(X)$  y  $V(X)$ .
14. La probabilidad de loguearse en una computadora desde una terminal remota es 0.8.
- a) Sea  $X$  el número de intentos independientes que deben realizarse hasta tener acceso a dicha computadora. Calcule la probabilidad de tener acceso en el segundo intento. Calcule la función de distribución acumulada de  $X$  y a partir de ella compute  $P(2 < X < 6)$  y  $P(3 \leq X \leq 5)$ .
- b) Si en un día se hacen 15 intentos independientes, ¿cuál es la probabilidad de que al menos en 12 se loguee? ¿Cuántas veces espera loguearse en los 15 intentos?
15. Alrededor del 20% de los usuarios no cierra el Windows-NT adecuadamente. Supongamos que el Windows-NT es instalado en una PC de acceso público en una biblioteca y que es usado por gente al azar en un orden aleatorio.
- a) En promedio, ¿cuánta gente debería usar esta PC hasta que algún usuario cierre adecuadamente el Windows-NT?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que de los próximos 10 usuarios, 6 cierren adecuadamente el Windows-NT?
16. Con el fin de encontrar una palabra clave, un motor de búsqueda de internet explora una secuencia de sitios de la WEB en orden aleatorio. Al iniciar la búsqueda, el motor elige, al azar y con igual probabilidad, una entre dos secuencias posibles de sitios. Se sabe que el 10% de los sitios de la primera secuencia contienen esta palabra clave, mientras que sólo el 5% de los sitios de la segunda contienen dicha palabra.
- a) Si la búsqueda termina ni bien se encuentra un sitio que contenga la palabra clave, ¿cuál es la probabilidad de que más de 5 sitios deban ser explorados?
- b) Si se sabe que el motor de búsqueda encontró la palabra clave en la sexta visita ¿cuál es la probabilidad de que la haya encontrado en la segunda secuencia?
- c) Si la búsqueda termina cuando se encuentran 2 sitios que contenga la palabra clave ¿cuál es la probabilidad de que deban explorarse exactamente 10 sitios?
17. Las tareas llegan a una cola de un sistema de computación con un solo servidor de acuerdo con un proceso de Poisson de parámetro  $\lambda = 5$  tareas por minuto. Llamemos a dicho proceso  $X_t$
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que en 30 segundos lleguen menos de 5 tareas?
- b) Sea  $X_1$  la cantidad de tareas recibidas en un minuto. Calcular las siguientes probabilidades utilizando solamente la función de distribución acumulada de  $X_1$ :
- $$P(X_1 \leq 6) \quad P(3 \leq X_1 \leq 6)$$
- $$P(X_1 = 6) \quad P(3 < X_1 < 6)$$
- $$P(X_1 \geq 5) \quad P(3 \leq X_1 \leq 6 | X_1 \geq 4)$$
- c) ¿Cuál es el número esperado de tareas que se reciben en media hora?

18. El número de caídas mensuales de un sistema de computación sigue un proceso de Poisson de parámetro  $\lambda = 0.25$  caídas en un mes.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente 3 caídas durante el año 2004?
  - b) ¿Cuál es la probabilidad de que haya por lo menos 3 caídas durante el año 2004?
  - c) ¿Cuántas caídas se espera tener en los primeros 6 meses de 2004?
  - d) Durante 2004, ¿cuál es la probabilidad de que haya al menos 3 meses con al menos 1 caída en cada mes?
19. Un bibliotecario ubica 1000 libros en un cierto día. Si la probabilidad de que un libro cualquiera sea mal ubicado es 0.001 y los libros se ubican en forma independiente, ¿cuál es la distribución aproximada del número de libros mal ubicados en ese día?
- Utilizando esta distribución, calcular la probabilidad de que
- a) por lo menos un libro sea mal ubicado ese día.
  - b) exactamente 3 libros sean mal ubicados ese día. Comparar con el valor exacto.
20. En un concurso de pesca cada pescador paga 100\$ por participar. La cantidad de peces obtenida por cada pescador durante el desarrollo del concurso siguen un proceso de Poisson con parámetro  $\lambda = 4$ . Hay un premio de 50\$ por pieza. Cada pescador tiene permitido cobrar a los sumo 6 piezas (es decir, aunque pesque más de 6 cobrará sólo por 6).
- a) Calcular la función de probabilidad puntual de la ganancia neta de un pescador.
  - b) ¿Cuánto dinero espera ganar cada participante?
21. El número de veces que una red de computadoras se bloquea sigue un proceso de Poisson de parámetro igual a 2 bloqueos por semana. Hallar la probabilidad de que
- a) en 2 semanas no se bloquee.
  - b) en un mes haya 1 semana en la que no se bloquee.
- (Sugerencia: Notar que se está preguntando por cantidad de semanas, no de bloqueos.)